

# Dwustosunek i biegunowe

Dominik Burek

18 marca 2012

# Przedmowa

Geometria od lat spędza sen z powiek olimpijczykom. Umiejętność rozwiązywania zadań tego typu jest bardzo ważna - niemal na każdym konkursie uczestnicy zmagają się z wykazywaniem rozmaitych faktów geometrycznych. Nie ma w Polsce zbyt wielu pozycji uczących geometrii. Praca ta ma na celu rozwijanie geometrycznego "szóstego zmysłu".

Praca jest skierowana do wszystkich czytelników zainteresowanych geometrią - zakładam znajomość podstawowych twierdzeń geometrii euklidesowej oraz rzutowej. Wprowadzę pojęcia biegunowej oraz dwustosunku i pokażę ich kilka interesujących własności. Są one zilustrowane licznymi przykładami wykorzystania w zadaniach olimpijskich. Każdy rozdział kończy się zadaniami do samodzielnego rozwiązania - ma to służyć utrwaleniu nabytej wiedzy przez czytelnika.

Chciałbym serdecznie podziękować mojemu opiekunowi naukowemu Tomaszowi Cieśli za pomoc przy składzie tekstu, tworzeniu rysunków oraz za cenne wskazówki dotyczące pracy.

*Dominik Burek*

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie niezbędnych pojęć</b>	<b>3</b>
1.1	Dwustosunek . . . . .	3
1.2	Biegunowe . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Przykłady zastosowań w zadaniach</b>	<b>7</b>
2.1	Biegunowe . . . . .	7
2.2	Dwustosunek i cztery lematy . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Rozwiązania</b>	<b>25</b>
3.1	Biegunowe . . . . .	25
3.2	Dwustosunek i cztery lematy . . . . .	27


# 1 Wprowadzenie niezbędnych pojęć

## 1.1 Dwustosunek

**Definicja 1.1.** Dane są cztery różne punkty  $A, B, C, D$  leżące na jednej prostej w kolejności  $A, C, B, D$ . Wartość wyrażenia

$$\frac{AC}{BC} \div \frac{AD}{BD}$$

nazywamy dwustosunkiem czwórki punktów  $A, B, C, D$  i zwykle oznaczamy przez  $(A, B; C, D)$ .



rys. 1.

Jeśli  $(A, B; C, D) = 1$ , to wtedy mówimy, że punkt  $C$  jest sprzężony harmonicznie do punktu  $D$  względem pary punktów  $(A, B)$  lub czwórka  $A, B, C, D$  jest harmoniczna lub para punktów  $(C, D)$  jest sprzężona harmonicznie względem pary  $(A, B)$ .

Wprost z definicji wynikają następujące fakty:

**Fakt 1.2.** Jeśli punkt  $C$  jest sprzężony harmonicznie do punktu  $D$  względem pary punktów  $(A, B)$ , to punkt  $D$  jest sprzężony harmonicznie do punktu  $C$  względem pary  $(A, B)$ .

**Fakt 1.3.** Jeśli para  $(C, D)$  jest sprzężona harmonicznie względem pary punktów  $(A, B)$ , to para punktów  $(A, B)$  jest sprzężona harmonicznie względem pary  $(C, D)$ .


**Fakt 1.4.** Dla ustalonych trzech punktów  $A, B, C$  istnieje dokładnie jeden punkt  $D$  taki, że czwórka  $A, B, C, D$  jest harmoniczna.

**Fakt 1.5.**  $(A, B; C, D) = (D, C; B, A)$  oraz  $(A, B; C, D) = \frac{1}{(B, A; C, D)}$ . Jeśli  $(A, B; C, D) = 1$ , to  $(A, B; C, D) = (B, A; C, D) = (A, B; D, C) = 1$ .

**Fakt 1.6.** Jeśli  $(A, B; C, D) = (A, B; C, D')$ , to  $D = D'$ .

Udowodnimy teraz bardzo ważne twierdzenie, z którego będziemy korzystać intuicyjnie.

**Twierdzenie 1.7.** Dany jest punkt  $P$  oraz prosta  $l$  niezawierająca punktu  $P$ . Punkty  $A, B, C, D$  leżą na prostej  $l$ . Prosta  $k$  różna od  $l$  niezawierająca punktu  $P$  przecina proste  $PA, PB, PC, PD$  w punktach odpowiednio  $A', B', C', D'$ . Wówczas  $(A, C; B, D) = (A', C'; B', D')$



rys. 2.

*Dowód.* Niech  $[F]$  oznacza pole figury  $F$ .

Mamy następujące związki:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{[ACP]}{[BCP]} = \frac{\frac{1}{2}AP \cdot CP \cdot \sin \angle APC}{\frac{1}{2}BP \cdot CP \cdot \sin \angle BPC} = \frac{AP}{BP} \cdot \frac{\sin \angle APC}{\sin \angle BPC}$$

i analogicznie

$$\frac{AD}{BD} = \frac{AP}{BP} \cdot \frac{\sin \angle APD}{\sin \angle BPD}$$

Zatem


$$(A, C; B, D) = \frac{AC}{BC} \div \frac{AD}{BD} = \frac{\sin \angle APC}{\sin \angle BPC} \div \frac{\sin \angle APD}{\sin \angle BPD}$$

Dowód twierdzenia został zakończony.  $\square$

Twierdzenie 1.7 jest motywacją do tego, aby wprowadzić notację dwustosunku czterech prostych  $a, b, c$  i  $d$  mających punkt wspólny  $P$ , jako liczbę  $(a, c; b, d) = P(A, C; B, D) = (PA, PC; PB, PD) = (A, C; B, D)$ , gdzie punkty  $A, B, C$  i  $D$  są odpowiednimi punktami przecięcia prostych  $a, b, c$  i  $d$  z dowolną prostą nie przechodzącą przez punkt  $P$ . Jeżeli  $(A, C; B, D) = 1$ , to powiemy, że proste  $a, b, c$  i  $d$  tworzą pęk harmoniczny (w tym przypadku punkty  $A', B', C'$  i  $D'$  będące odpowiednimi punktami przecięcia prostych  $a, b, c$  i  $d$  z dowolną prostą nie przechodzącą przez punkt  $P$  tworzą czwórkę harmoniczną).

Przyjmijmy jednak następującą umowę. Jeżeli niewspółliniowe punkty  $X, Y, Z$  i  $T$  są takie, że  $X \in a, Y \in b, Z \in c$  i  $T \in d$ , gdzie proste  $a, b, c$  i  $d$  mają punkt wspólny  $P$  różny od punktów  $X, Y, Z$  i  $T$ , to dwustosunek prostych  $a, b, c$  i  $d$  oznaczmy przez  $(a, c; b, d)$  lub  $P(X, Z; Y, T)$  lub  $(PX, PZ; PY, PT)$ , lecz nie oznaczmy go jako  $(X, Z; Y, T)$ , gdyż punkty  $X, Y, Z$  i  $T$  nie leżą na jednej prostej. Notacja ta okaże się bardzo wygodna w pewnych konfiguracjach geometrycznych, gdzie kłopotliwe będzie wprowadzanie oznaczeń nowych punktów. Aby zidentyfikować proste, których dwustosunek chcemy obliczyć wskażemy ich punkt wspólny oraz po jednym dowolnym punkcie na każdej z nich (zobaczmy to przy okazji następnego twierdzenia). Jednakże, przyjmując oznaczenia punktów i prostych jak wyżej należy pamiętać, że  $(a, c; b, d) = P(X, Z; Y, T) = (PX, PZ; PY, PT) = (A, C; B, D)$ , gdzie punkty  $A, B, C$  i  $D$  są odpowiednimi punktami przecięcia prostych  $a, b, c$  i  $d$  z dowolną prostą nieprzechodzącą przez punkt  $P$ .

**Twierdzenie 1.8.** Przypuśćmy, że punkty  $P_1, P_2, A, B, C, D$  leżą na okręgu. Wówczas  $(P_1A, P_1B; P_1C, P_1D) = (P_2A, P_2B; P_2C, P_2D)$ .



rys. 3.

*Dowód.* Rozważmy dowolną prostą nie przechodzącą przez punkt  $P_1$  i przecinającą proste  $P_1A, P_1B, P_1C$  i  $P_1D$  w punktach odpowiednio  $X, Y, Z$  i  $T$ . Na podstawie dowodu twierdzenia 1.7 dostajemy zależność:

$$(P_1A, P_1B; P_1C, P_1D) = (X, Z; Y, T) = \frac{\sin \angle AP_1C}{\sin \angle BP_1C} \div \frac{\sin \angle AP_1D}{\sin \angle BP_1D}$$

Widzimy, że dwustosunek  $(P_1A, P_1B; P_1C, P_1D)$  jest zależny jedynie od kątów  $AP_1C, BP_1C, AP_1D$  i  $BP_1D$ , a ponieważ punkty  $P_1, P_2, A, B, C$  i  $D$  leżą na jednym okręgu, to wykorzystując twierdzenie o równości kątów wpisanych opartych na tym samym łuku ustalonego okręgu, otrzymujemy tezę.  $\square$


Jeżeli punkty  $P, A, B, C$  i  $D$  leżą na jednym okręgu  $\omega$  oraz zachodzi równość  $P(A, C; B, D) = 1$ , to powiemy, że czworokąt  $ABCD$  jest harmoniczny. Na podstawie powyższego twierdzenia, dla dowolnego punktu  $Q \in \omega$  mamy równość  $Q(A, C; B, D) = 1$ . Gdy punkt  $Q$  jest jednym z punktów  $A, B, C$  lub  $D$  wówczas np. prosta  $AA$  to styczna do  $\omega$  w punkcie  $A$ .

W geometrii płaszczyzny rzutowej każda prosta oprócz punktów własnych ma jeszcze jeden dodatkowy punkt: swój kierunek lub tzw. punkt w nieskończoności. Kierunek prostej jest tym, co ta prosta ma wspólnego z wszystkimi prostymi do niej równoległymi. Punkt w nieskończoności ustalonej prostej będziemy w tej pracy oznaczać przez  $X_\infty$ .

## 1.2 Biegunowe


Prostą biegunową punktu  $P$  względem okręgu  $\omega$  o środku w punkcie  $O$  różnym od  $P$ , nazywamy prostą zawierającą obraz inwersyjny punktu  $P$  względem  $\omega$  prostopadłą do  $OP$ . Biegunem prostej  $l$  względem okręgu  $\omega$  nazwiemy punkt, którego biegunową względem okręgu  $\omega$  jest prosta  $l$ . Jeśli  $P = O$  to biegunową punktu  $P$  względem  $\omega$  jest prosta w nieskończoności i odwrotnie. Natomiast gdy  $P$  jest punktem w nieskończoności to jego biegunową względem  $\omega$  jest linia przechodząca przez  $O$  i prostopadła do jakiejś prostej przechodzącej przez punkt  $P$  i odwrotnie. Łatwo zauważyć, że:

1) Jeśli punkt  $P$  leży na zewnątrz  $\omega$ , to prowadząc styczne  $PA$  i  $PB$  do  $\omega$ , prosta  $AB$  jest biegunową punktu  $P$  względem  $\omega$ .



rys. 4.


2) Jeśli punkt  $P$  leży wewnątrz  $\omega$ , to przez  $P$  prowadzimy cięciwę  $AB$  okręgu  $\omega$  tak, aby punkt  $P$  był środkiem odcinka  $AB$ . Następnie rysujemy styczne do  $\omega$  w punktach  $A$  i  $B$  aż do przecięcia się w punkcie  $S$ . Prostą biegunową punktu  $P$  względem  $\omega$  określamy w tym przypadku jako prostą zawierającą punkt  $S$  i prostopadłą do  $OP$ .



rys. 5.

Pojęcie prostej biegunowej jest jednym z podstawowych elementów geometrii rzutowej, która znajduje swoje zastosowanie w wielu trudnych problemach olimpijskich. Najpierw jednak przedstawimy i udowodnimy kilka własności prostych biegunowych.

**Twierdzenie 1.9.** Proste  $PA$  i  $PB$  są styczne do okręgu  $\omega$  w punktach odpowiednio  $A$  i  $B$ . Przez punkt  $P$  prowadzimy prostą przecinającą  $\omega$  w punktach  $C$  i  $D$  oraz odcinek  $AB$  w punkcie  $S$ . Wówczas  $(D, C; S, P) = 1$ .




rys. 6.

*Dowód.* Z definicji dwustosunku wystarczy pokazać, że  $\frac{CS}{SD} = \frac{PC}{PD}$ . Zauważmy, że trójkąty  $PCB$  oraz  $PDB$  są podobne (proste porównanie kątów). Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, przeto  $\frac{PC}{PD} = \left(\frac{BC}{BD}\right)^2$ , gdyż trójkąty  $PDB$  i  $PCB$  mają wspólną wysokość. Analogicznie otrzymujemy, iż  $\frac{PC}{PD} = \left(\frac{AC}{AD}\right)^2$ . Łącząc powyższe związki uzyskujemy równość  $\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{BD}$ . Stąd  $\frac{CS}{SD} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin \angle ACB}{\frac{1}{2} \cdot AD \cdot BD \cdot \sin \angle BDA} = \frac{AC}{AD} \cdot \frac{BC}{BD} = \left(\frac{AC}{AD}\right)^2 = \frac{PC}{PD}$ .  $\square$

**Twierdzenie 1.10.** Dwie różne proste przechodzące przez punkt  $P$  przecinają okrąg  $\omega$  w punktach odpowiednio  $X, Y$ , oraz  $Z$  i  $T$ . Wówczas:

- 1) Przekątne czworokąta  $XYZT$  przecinają się na biegunowej punktu  $P$  względem  $\omega$ .
- 2) Proste  $XZ$  oraz  $YT$  przecinają się na biegunowej punktu  $P$  względem  $\omega$ .



rys. 7.

*Dowód.* Udowodnimy tylko pierwszą część twierdzenia, pokazanie drugiej części proponujemy czytelnikowi jako proste ćwiczenie.


Przyjmijmy oznaczenia  $R = XT \cap ZY$ ,  $Q = ZX \cap TY$ ,  $K = QR \cap PZ$ ,  $L = QR \cap PX$ . Na mocy twierdzenia 1.7 otrzymujemy równości:

$$(T, Z; K, P) = (Y, X; L, P) = (Z, T; K, P) = \frac{1}{(T, Z; K, P)}.$$

Stąd,  $(T, Z; K, P) = (Y, X; L, P) = 1 \implies$  punkty  $K$  i  $L$  leżą na biegunowej punktu  $P$  względem okręgu  $\omega$ , którą jest prosta  $QR$ .  $\square$

Pokażemy teraz twierdzenie, które jest bardzo użyteczne w wielu zadaniach geometrycznych.

**Twierdzenie 1.11** (La Hire). Jeśli punkt  $X$  należy do prostej biegunowej punktu  $Y$  względem okręgu  $\omega$ , to punkt  $Y$  należy do biegunowej punktu  $X$  względem  $\omega$ .




rys. 8.

*Dowód.* Niech punkt  $X$  należy do biegunowej punktu  $Y$ . Oznaczmy przez  $X'$  i  $Y'$  obrazy inwersyjne względem  $\omega$  odpowiednio punktów  $X$  i  $Y$ . Biegunowa punktu  $X$  jest prostopadła do  $OX'$  w punkcie  $X'$ , oraz trójkąt  $OX'Y$  jest prostokątny. Wiemy, że trójkąty  $OX'Y$  i  $OY'X$  są podobne, stąd punkt  $X$  leży na prostej prostopadłej do  $OY'$  w punkcie  $Y'$ , która jest biegunową punktu  $Y$  względem  $\omega$ .  $\square$

Wprost z twierdzenia 1.11 wynikają następujące wnioski:

**Wniosek 1.12.** Jeśli chcemy pokazać, że punkt  $A$  należy do prostej  $l$  wystarczy pokazać, że biegun prostej  $l$  względem  $\omega$  leży na prostej biegunowej punktu  $A$  względem  $\omega$ .

**Wniosek 1.13.** Jeśli chcemy pokazać, że trzy punkty są współliniowe, wystarczy udowodnić, że ich proste biegunowe względem  $\omega$  są współpękowe i na odwrót - jeśli chcemy pokazać, że trzy proste są współpękowe, wystarczy pokazać, że ich bieguny względem  $\omega$  są współliniowe.



rys. 9.

Oczywiście powyższe wnioski możemy zastosować dla dowolnej liczby punktów i prostych.


## 2 Przykłady zastosowań w zadaniach

W tym rozdziale zajmiemy się rozwiązywaniem zadań pochodzących z różnych olimpiad, wykorzystując poznane twierdzenia i definicje.

### 2.1 Biegunowe

Zacznijmy od czegoś łatwego.

**Zadanie 2.1.** Dany jest czworokąt  $ABCD$  wpisany w okrąg  $\omega$ . Punkty przecięcia prostych  $AD$  i  $BC$  oraz  $CD$  i  $AB$  to odpowiednio  $P$  i  $Q$ . Przekątne czworokąta  $ABCD$  przecinają się w punkcie  $S$ . Prosta  $PS$  przecina  $\omega$  w punktach  $K$  i  $L$ . Pokazać, że proste  $QK$  i  $QL$  są styczne do  $\omega$  odpowiednio w punktach  $K$  i  $L$ .




rys. 10.

*Dowód.* Niech proste  $QK'$  i  $QL'$  będą stycznymi do  $\omega$ . Z twierdzenia 1.10 wynika, że prosta  $PS$  jest biegunową punktu  $Q$  względem  $\omega$ . Zatem z definicji biegunowej otrzymujemy, iż  $K$  i  $L$  należą do  $PS$ , a to oznacza, że  $K = K'$  i  $L = L'$ .  $\square$

**Zadanie 2.2.** Okrąg  $\omega$  wpisany w czworokąt  $ABCD$  jest styczny do boków  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  odpowiednio w punktach  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $H$ .

- Pokazać, że proste  $AC$ ,  $EF$ ,  $GH$  przecinają się w jednym punkcie.
- Pokazać, że proste  $AC$ ,  $BD$ ,  $EG$ ,  $FH$  przecinają się w jednym punkcie. (Jest to szczególny przypadek twierdzenia Brianchona.)






rys. 11.

*Dowód.* a) Niech przekątne czworokąta  $ABCD$ , proste  $EF$  i  $GH$  oraz  $EH$  i  $GF$  przecinają się w punktach odpowiednio  $P$ ,  $Q$  i  $R$ . Punkt  $Q$  leży na biegunowych punktów  $D$  i  $B$  względem  $\omega$ , stąd korzystając z twierdzenia 1.11 wnioskujemy, iż prosta  $BD$  jest biegunową punktu  $Q$  względem  $\omega$ . Analogicznie prosta  $AC$  jest biegunową punktu  $R$  względem  $\omega$ . Z twierdzenia 1.10 wynika, że prosta  $PQ$  jest biegunową punktu  $R$  względem  $\omega$ , zatem punkty  $Q$ ,  $A$ ,  $C$  muszą być współliniowe.

b) Teza wynika z dowodu podpunktu a) gdyż punkty  $A$ ,  $P$ ,  $C$  leżą na biegunowej punktu  $R$  względem  $\omega$ , natomiast punkty  $D$ ,  $P$ ,  $B$  leżą na biegunowej punktu  $Q$  względem  $\omega$ .  $\square$


**Zadanie 2.3.** W trójkącie  $ABC$  okrąg  $\omega$  o środku  $I$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Proste  $EF$  i  $BC$  przecinają się w punkcie  $S$ . Pokazać, że  $SI \perp AD$ .



rys. 12.

*Dowód.* Na mocy twierdzenia 1.11 łatwo zauważamy, że prosta  $AD$  jest biegunową punktu  $S$  względem  $\omega$ , zatem  $SI \perp AD$ .  $\square$


**Zadanie 2.4** (Twierdzenie Brocarda). W czworokącie  $ABCD$  wpisanym w okrąg  $\omega$  o środku  $O$  przekątne, proste  $AD$  i  $BC$  oraz proste  $AB$  i  $CD$  przecinają się odpowiednio w punktach  $P$ ,  $Q$  i  $R$ . Wykazać, że punkt  $O$  jest ortocentrum trójkąta  $PQR$ .



rys. 13.

*Wskazówka.* Na podstawie pierwszego zadania oraz twierdzenia 1.11 widzimy, że proste  $RP$ ,  $PQ$  i  $QR$  są biegunowymi odpowiednio punktów  $Q$ ,  $R$  i  $P$  względem  $\omega$ . Zatem  $OQ \perp RP$ ,  $OR \perp PQ$  i  $OP \perp QR$ , stąd punkt  $O$  jest ortocentrum trójkąta  $PQR$ .


**Zadanie 2.5.** (Chiny 1996) Niech  $H$  będzie ortocentrum trójkąta  $ABC$ . Z punktu  $A$  rysujemy styczne  $AP$  i  $AQ$  do okręgu o średnicy  $BC$ , gdzie  $P$  i  $Q$  to punkty styczności. Pokazać, że punkty  $P$ ,  $Q$ ,  $H$  są współliniowe.



rys. 14.

*Dowód.* Niech  $BD$  i  $CE$  będą wysokościami trójkąta  $ABC$ . Oczywiście na czworokącie  $BCDE$  da się opisać okrąg  $\omega$ . Przyjmijmy, że proste  $ED$  i  $BC$  przecinają się w punkcie  $R$ . Wówczas prosta  $RH$  to biegunowa punktu  $A$  względem  $\omega$ , jednakże na tej prostej leżą również punkty  $P$  i  $Q$ .  $\square$

**Zadanie 2.6.** (Autorskie) W trójkącie  $ABC$  okrąg wpisany  $\omega$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Proste  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$  przecinają  $\omega$  w odpowiednich punktach  $X$ ,  $Y$  i  $Z$ . Okrąg  $\omega_1$  jest styczny do  $\omega$  w punkcie  $X$  oraz przecina bok  $EF$  w punktach  $D_1$  i  $D_2$ . Analogicznie definiujemy okręgi  $\omega_2$  i  $\omega_3$  oraz punkty  $E_1, E_2$  i  $F_1, F_2$ . Dowieść, że proste  $DD_1, EE_1$  i  $FF_1$  przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy gdy proste  $DD_2, EE_2$  i  $FF_2$  przecinają się w jednym punkcie.



rys. 15.


*Dowód.* Niech wspólna styczna do  $\omega$  i  $\omega_1$  w punkcie  $X$  przecina prostą  $BC$  w punkcie  $T$ . Korzystając z twierdzenia 1.11 widzimy, że punkty  $E, F$  i  $T$  są współliniowe. Oznaczmy okrąg opisany na trójkącie  $DD_1D_2$  przez  $o$ . Łatwo zauważamy, że punkt  $T$  jest środkiem potęgowym okręgów  $\omega$  i  $o$ , zatem korzystając z twierdzenia o trzech osiach potęgowych punkt  $T$  należy do osi potęgowej  $\omega$  i  $o$ . Jednakże okręgi te mają jeden punkt wspólny  $D$ , oraz prosta  $TD$  jest styczna do  $\omega$  przeto są one styczne wewnętrznie w punkcie  $D$ . Zatem  $\angle D_1DF = \angle D_1DB - \angle FDB = \angle D_1D_2D - \angle FED = \angle EDD_2$ . Stąd proste  $DD_1$  i  $DD_2$  są izogonalnie sprzężone. Analogicznie dowodzimy, że pary prostych  $EE_1$  i  $EE_2$  oraz  $FF_1$  i  $FF_2$  są izogonalnie sprzężone. Teza zadania jest konsekwencją trygonometrycznej wersji twierdzenia Cevy.  $\square$

Przejdźmy do zadań trudniejszych.

**Zadanie 2.7.** W trójkącie  $ABC$  punkt  $I$  to środek okręgu wpisanego. Niech prosta  $l$  będzie styczną do okręgu wpisanego różną od jego boków. Na prostej  $l$  oświadamy punkty  $X, Y, Z$  takie, że:

$$\angle AIX = \angle BIY = \angle CIZ = 90^\circ \quad (1)$$

Udowodnić, że proste  $AX, BY$  i  $CZ$  przecinają się w jednym punkcie.



rys. 16.

*Dowód.* Oznaczmy okrąg wpisany w trójkąt  $ABC$  przez  $\omega$ . Niech  $\omega$  będzie styczny do prostej  $l$  oraz boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $P$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$ . Zrzutujemy punkt  $P$  na proste  $EF$ ,  $FD$ ,  $DE$  otrzymując punkty odpowiednio  $K$ ,  $L$ ,  $M$ . Zauważmy, że  $PK \perp EF \perp AI \perp IX$ . Prosta  $PK$  jest więc biegunową punktu  $X$  względem  $\omega$  ( $PX$  jest styczną do  $\omega$ ). Analogicznie wnioskujemy, iż proste  $PL$  oraz  $PM$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $Y$  i  $Z$  względem  $\omega$ . Ponadto wiadomo, że proste  $EF$ ,  $FD$  i  $ED$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Stąd punkt  $K$  będący punktem przecięcia biegunowych punktów  $A$  i  $X$  jest biegunem prostej  $AX$  względem  $\omega$ . Podobnie punkty  $L$  i  $M$  są biegunami odpowiednio prostych  $BY$  i  $CZ$ . Korzystając z wniosku 1.13 zauważamy, że wystarczy pokazać współliniowość punktów  $K$ ,  $L$  i  $M$ . Jednakże leżą one na prostej Simsona trójkąta  $DEF$ .  $\square$


**Zadanie 2.8.** W trójkącie  $ABC$  proste  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$  są współpękowe (punkty  $D$ ,  $E$  i  $F$  leżą na bokach trójkąta). Proste  $EF$ ,  $FD$  i  $DE$  przecinają proste  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ . Rysujemy styczną  $XU$  do okręgu  $\omega$  opisanego na trójkącie  $ABC$  (punkt  $U$  leży na łuku który nie zawiera punktu  $A$ ). Analogicznie rysujemy styczne  $YV$  i  $ZW$ . Pokazać, że proste  $AU$ ,  $BV$  i  $CW$  przecinają się w jednym punkcie.

*Dowód.* Udowodnimy najpierw dwa lematy.

**Lemat 2.9.** Punkty  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  są współliniowe.


*Dowód lematu.* Współliniowość punktów  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  jest konsekwencją twierdzenia Desarguesa dla trójkątów  $ABC$  i  $DEF$ , które posiadają środek perspektywiczny. Można również to pokazać używając twierdzenia Menelausa dla trójkąta  $ABC$  i punktów  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ .

**Lemat 2.10** (Steinbart). Okrąg  $o$  wpisany w trójkąt  $ABC$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Punkty  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  leżą odpowiednio na krótszych łukach  $EF$ ,  $FD$  i  $DE$  okręgu  $o$ . Udowodnić, że proste  $XD$ ,  $YE$ ,  $ZF$  przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy gdy proste  $AX$ ,  $BY$  i  $CZ$  przecinają się w jednym punkcie.



rys. 17.


*Wskazówka.* Obie implikacje można pokazać korzystając z trygonometrycznej wersji twierdzenia Cevy.



rys. 18.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Poprowadźmy styczne do okręgu  $\omega$  w punktach  $A, B, C$ . Oznaczmy wierzchołki otrzymanego trójkąta przez  $P, Q$  i  $R$  (punkty  $P, Q$  i  $R$  leżą na przeciwko odpowiednio wierzchołków  $A, B, C$ ). Z lematu 2.10 wynika, że wystarczy pokazać że proste  $PU, QV, RW$  przecinają się w jednym punkcie. Stosując wniosek 1.13 widzimy, iż współpękowość prostych  $PU, QV, RW$  jest równoważna temu, że ich bieguny względem  $\omega$  są współliniowe. Jednak punkt  $X$  należy do prostej  $BC$  - czyli biegunowej punktu  $P$  względem  $\omega$ . Zatem korzystając z twierdzenia 1.11 zauważamy, że punkt  $P$  należy do biegunowej punktu  $X$  względem  $\omega$ , lecz do tej biegunowej należy również punkt  $U$  (prosta  $XU$  jest styczna do  $\omega$ ). Oznacza to, że punkt  $X$  jest biegunem prostej  $PU$ . Analogicznie punkty  $Y$  i  $Z$  są biegunami odpowiednio prostych  $QV$  i  $RW$  względem  $\omega$ . Na podstawie lematu 2.9 otrzymujemy tezę zadania.  $\square$


**Zadanie 2.11.** (Zwardoń 2003) Okrąg  $o$  jest wpisany w trójkąt  $ABC$ . Okrąg przechodzący przez punkty  $B$  i  $C$  jest styczny wewnętrznie do okręgu  $o$  w punkcie  $D$ . Analogicznie definiujemy punkty  $E$  i  $F$ . Wykazać, że proste  $AD, BE$  i  $CF$  przecinają się w jednym punkcie.



rys. 19.

*Dowód.* Niech punkty  $K, L$  i  $M$  będą punktami styczności okręgu  $o$  z bokami odpowiednio  $BC, CA$  i  $AB$  trójkąta  $ABC$ . Z lematu Steinbarta widzimy, że wystarczy pokazać, że proste  $DK, EL$  i  $FM$  przecinają się w jednym punkcie. Współpękowość prostych  $DK, EL$  i  $FM$  na podstawie wniosku 1.13 jest równoważna współliniowości biegunów tych prostych względem  $o$ . Biegunem prostej  $DK$  względem  $o$  jest punkt  $X$  przecięcia prostej stycznej do  $o$  w punkcie  $D$ , z bokiem  $BC$ . Analogicznie definiujemy punkty  $Y, Z$ . Współliniowość punktów  $X, Y$  i  $Z$  jest oczywista, gdyż leżą one na osi potęgowej  $o$  i okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$ .  $\square$

**Zadanie 2.12.** W trójkącie  $ABC$  okrąg wpisany  $\omega$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Punkty  $P$ ,  $Q$  i  $R$  leżą odpowiednio na bokach  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$ . Punkt  $X$  jest punktem przecięcia stycznej do  $\omega$  poprowadzonej z punktu  $P$  różnej od  $BC$  z prostą  $QR$ . Analogicznie definiujemy punkty  $Y$  i  $Z$ . Dowieść, że jeśli proste  $AP$ ,  $BQ$  i  $CR$  przecinają się w jednym punkcie, to punkty  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  leżą na jednej prostej.



rys. 20.


*Dowód.* Niech  $PK$  będzie styczną do  $\omega$  różną od  $BC$ . Analogicznie definiujemy punkty  $L$  i  $M$  ( $QL$  i  $RM$  są styczne do  $\omega$ ). Bieguny prostych  $PQ$ ,  $QR$  i  $RS$  względem  $\omega$  oznaczmy przez odpowiednio  $U$ ,  $V$  i  $W$ . Punkt  $U$  jest punktem przecięcia prostych  $DK$  i  $LE$ , gdyż te proste są biegunowymi odpowiednio punktów  $P$  i  $Q$ . Analogicznie punkt  $V$  jest punktem przecięcia prostych  $LE$  i  $FM$  oraz punkt  $W$  jest punktem przecięcia prostych  $FM$  i  $DK$ . Zauważmy, że punkt  $X$  leży na prostej  $QR$ , czyli na biegunowej punktu  $V$  względem  $\omega$ . Zatem korzystając z twierdzenia 1.11 punkt  $V$  leży na biegunowej punktu  $X$  względem  $\omega$ . Jednakże punkt  $K$  również należy do tej biegunowej (prosta  $PX$  styczna do  $\omega$  w punkcie  $K$ ), w efekcie prosta  $VK$  jest biegunową punktu  $X$  względem  $\omega$ . Analogiczne rozumowanie pozwala nam stwierdzić, że proste  $WL$  i  $UM$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $Y$  i  $Z$  względem  $\omega$ . Korzystając z wniosku 1.13 stwierdzamy, że współliniowość punktów  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  jest równoważna współpękowości prostych  $UM$ ,  $VK$  i  $WL$ . Niech proste  $QR$ ,  $RP$  i  $PQ$  przecinają proste odpowiednio  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach  $X_1$ ,  $Y_1$  i  $Z_1$ , w tej kolejności. Na mocy warunków zadania trójkąty  $ABC$  i  $PQR$  mają środek perspektywiczny, zatem korzystając z twierdzenia Desarguesa posiadają one również oś perspektywiczną i jest nią prosta zawierająca punkty  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$ ; w szczególności punkty te są współliniowe. Punkt  $X_1$  leży na prostej  $QR$  czyli na biegunowej punktu  $V$  względem  $\omega$ . Korzystając ponownie z twierdzenia 1.11 widzimy, że prosta  $VD$  jest biegunową punktu  $X_1$  względem  $\omega$ . Analogicznie proste  $UF$  i  $WE$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $Z_1$  i  $Y_1$  względem  $\omega$ . Biorąc pod uwagę to, że punkty  $X_1$ ,  $Y_1$  i  $Z_1$  jak wyżej pokazaliśmy są współliniowe na mocy wniosku 1.13 wnosimy, że proste  $UF$ ,  $VD$  i  $WE$  są współpękowe. Stąd na podstawie twierdzenia Cevy mamy:  $\frac{WD}{DU} \cdot \frac{UE}{EV} \cdot \frac{VF}{FW} = 1$ , mnożąc to równanie przez  $\frac{WK}{KU} \cdot \frac{UL}{LV} \cdot \frac{VM}{MW}$  i korzystając z potęgi punktów  $U$ ,  $V$  i  $W$  względem  $\omega$  uzyskamy zależność  $\frac{WK}{KU} \cdot \frac{UL}{LV} \cdot \frac{VM}{MW} = 1$ , a to dzięki twierdzeniu odwrotnego do twierdzenia Cevy implikuje współpękowość prostych  $UM$ ,  $VK$  i  $WL$ , czyli tezę zadania.  $\square$

*Uwaga.* W zależności od konfiguracji punkty  $U$ ,  $V$  lub  $W$  mogą leżeć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz  $\omega$ , jednak nie wpływa to w znacznym stopniu na rozwiązanie zadania. W ostatniej części rozwiązania będziemy musieli jedynie skorzystać z twierdzenia Cevy dla punktów leżących wewnątrz boków trójkąta  $UVW$ .

**Zadanie 2.13.** Dany jest okrąg  $o$  opisany na trójkącie ostrokątnym  $ABC$ . Punkty  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  są środkami odpowiednio łuków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  okręgu  $o$  niezawierających odpowiednio wierzchołków  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Niech punkty  $P$ ,  $Q$  i  $R$  będą środkami boków odpowiednio  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$ . Pokazać, że biegunowe punktów  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  względem okręgu  $\omega$  wpisanego w trójkąt  $ABC$  przecinają odpowiednie proste zawierające boki trójkąta  $PQR$  w trzech punktach leżących na jednej prostej.


*Dowód.* Zaczniemy od pokazania lematu, który dotyczy biegunu linii środkowej trójkąta  $ABC$  względem okręgu weń wpisanego.

**Lemat 2.14.** Dany jest okrąg  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  wpisany w trójkąt  $ABC$ . Niech punkty  $M$  i  $N$  będą środkami boków odpowiednio  $AB$  i  $AC$ . Wówczas biegunem prostej  $MN$  względem  $\omega$  jest ortocentrum trójkąta  $BIC$ .



*Dowód.* rys. 21.

Niech okrąg  $\omega$  będzie styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Przyjmijmy, że prosta  $MN$  przecina  $\omega$  w punktach odpowiednio  $R$  i  $T$  (punkt  $T$  leży bliżej punktu  $N$ ). Jeśli prosta  $BI$  przecina prostą  $EF$  w punkcie  $S$  to na podstawie lematu 2.30 mamy -  $BS \perp SC$ . Zatem ortocentrum  $H$  trójkąta  $BIC$  jest punktem przecięcia prostych  $DI$  i  $SC$ . Jednakże  $TM \perp ID$ , więc na mocy twierdzenia 1.11 wystarczy pokazać, że punkty  $H$ ,  $E$  i  $P$  są współliniowe gdzie  $P$  jest punktem styczności drugiej stycznej do  $\omega$  poprowadzonej z punktu  $N$ . Oznaczmy przez  $K$  środek boku  $BC$ . Wówczas  $\angle BSK = \angle KBS = \angle SBA$ . Stąd  $SK \parallel AB$ , zatem  $N = SK \cap AC$  oraz łatwo widzimy, że  $NE = NS$ . Jeśli  $W = MN \cap SC$  to  $\angle KSC = \angle SCK = \angle SWT$ , więc  $ST = TW$ . Łącząc powyższe równości dostajemy, iż punkt  $N$  jest środkiem okręgu opisanego na czworokącie  $ESWP$ . Jednakże jeśli  $Z = MN \cap ID$  to punkty  $I$ ,  $Z$ ,  $P$ ,  $E$  i  $N$  leżą na jednym okręgu. Podobnie punkty  $Z$ ,  $I$ ,  $S$  i  $W$  leżą na jednym okręgu. Na mocy twierdzenia o trzech osiach potęgowych otrzymujemy tezę lematu.  $\square$



rys. 22.

Przejdźmy do właściwej części zadania. Wprowadźmy oznaczenia  $H_1$ ,  $H_2$  i  $H_3$  - ortocentra trójkątów odpowiednio  $IBC$ ,  $ICA$  i  $IAB$ , gdzie  $I$  to środek okręgu  $\omega$ . Na podstawie lematu 2.14 punkty  $H_1$ ,  $H_2$  i  $H_3$  są biegunami odpowiednio prostych  $PQ$ ,  $QR$  i  $RP$  względem  $\omega$ . Na podstawie twierdzenia 1.11 przecięcie prostej  $PQ$  z

biegunową punktu  $X$  jest biegunem  $S_1$  prostej  $H_1X$  względem  $\omega$ . Analogicznie punkty, których współliniowość wraz z punktem  $S_1$  chcemy pokazać to bieguny  $S_2$  i  $S_3$  prostych odpowiednio  $H_2Y$  i  $H_3Z$ . Na podstawie wniosku 1.13 wystarczy pokazać, że proste  $H_1X$ ,  $H_2Y$  i  $H_3Z$  są współpękowe. Zauważmy ponadto, że punkty  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  są środkami okręgów opisanych na trójkątach  $IBC$ ,  $ICA$  i  $IAB$  w tej kolejności (łatwe przeliczenie na kątach). Proste  $H_1X$ ,  $H_2Y$  i  $H_3Z$  są zatem prostymi Eulera trójkątów  $IBC$ ,  $IAB$  i  $ICA$ . Jednakże przecinają się one w punkcie Schifflera ( $X_{21}$ ), leżącym na prostej Eulera trójkąta  $ABC$  (jest to znany rezultat czytaj <http://faculty.evansville.edu/ck6/tcenters/recent/schiff.html>).  $\square$

W tym miejscu podajemy zadania do samodzielnego rozwiązania.

**Zadanie 2.15.** Niech punkty  $P$  i  $Q$  będą dwoma punktami na półokręgu  $\omega$  o średnicy  $AB$ . Styczne do  $\omega$  poprowadzone z punktów  $P$  i  $Q$  oraz proste  $AP$  i  $BQ$  przecinają się odpowiednio w punktach  $R$  i  $S$ . Pokazać, że  $RS \perp AB$ .

**Zadanie 2.16.** (LVII Olimpiada Matematyczna) Okrąg o środku  $O$  wpisany w czworokąt wypukły  $ABCD$  jest styczny do boków  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$  odpowiednio w punktach  $K$ ,  $L$ ,  $M$ ,  $N$ , przy czym proste  $KL$  i  $MN$  przecinają się w punkcie  $S$ . Dowieść, że proste  $BD$  i  $OS$  są prostopadłe

**Zadanie 2.17.** W trójkącie  $ABC$  prosta  $l$  jest styczną do okręgu  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  wpisanego w trójkąt  $ABC$ , różną od  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$ . Prosta  $l$  przecina proste zawierające boki trójkąta w punktach odpowiednio  $M$ ,  $N$  i  $P$ . Z punktu  $I$  prowadzimy proste prostopadłe do prostych  $IM$ ,  $IN$  i  $IP$  aż do ich przecięcia z odpowiednimi prostymi zawierającymi boki trójkąta  $ABC$ , odpowiednio w punktach  $M_1$ ,  $N_1$  i  $P_1$ . Pokazać, że punkty  $M_1$ ,  $N_1$  i  $P_1$  leżą na jednej prostej.

**Zadanie 2.18.** Dwa trójkąty  $ABC$  i  $KLM$  mają wspólny okrąg wpisany  $\omega$ . Okrąg  $\omega$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $D$ ,  $E$  i  $F$  oraz do boków  $ML$ ,  $LK$  i  $KM$  odpowiednio w punktach  $P$ ,  $Q$  i  $R$ . Wykazać, że proste  $AP$ ,  $BQ$  i  $CR$  przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy proste  $KD$ ,  $LE$  i  $MF$  przecinają się w jednym punkcie.

**Zadanie 2.19.** W trójkącie  $ABC$  dane są wysokości  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$ . Okrąg  $\omega_1$  przechodzący przez punkty  $E$  i  $F$  jest styczny wewnętrznie do okręgu  $\omega$  opisanego na trójkącie  $ABC$  w punkcie  $A_1$ , leżącym na łuku  $BC$  nie zawierającym punktu  $A$ . Analogicznie definiujemy okręgi  $\omega_2$  i  $\omega_3$  oraz punkty  $B_1$  i  $C_1$ . Pokazać, że proste  $AA_1$ ,  $BB_1$  i  $CC_1$  przecinają się w jednym punkcie.

**Zadanie 2.20.** Okrąg  $\omega$  o środku w  $I$  wpisany w trójkąt  $ABC$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Punkty  $M$  i  $N$  są środkami odpowiednio odcinków  $AB$  i  $BC$ . Udowodnić, że proste  $MN$ ,  $EF$  i  $CI$  przecinają się w jednym punkcie.

**Zadanie 2.21.** (Autorskie) W trójkącie  $ABC$  okrąg  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  dopisany do prostej  $BC$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Punkt  $P$  jest rzutem prostokątnym punktu  $C$  na prostą  $BI$ . Prosta  $CP$  przecina  $\omega$  w punkcie  $Q$ . Punkty  $M$  i  $N$  są środkami odpowiednio odcinków  $AB$  i  $AC$ . Proste  $MN$  i  $DE$  przecinają się w punkcie  $S$ . Wykazać, że prosta  $SQ$  jest styczna do  $\omega$ .

**Zadanie 2.22.** (Iran 2009) W trójkącie  $ABC$  prosta  $l$  jest styczna do okręgu  $\omega$  wpisanego w ten trójkąt. Prosta  $l'$  przecina boki  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $A_1$ ,  $B_1$  i  $C_1$ . Z punktu  $A_1$  prowadzimy prostą styczną do  $\omega$  aż do przecięcia się z prostą  $l$  w punkcie  $A_2$ . Analogicznie definiujemy punkty  $B_2$  i  $C_2$ . Pokazać, że proste  $AA_2$ ,  $BB_2$  i  $CC_2$  przecinają się w jednym punkcie.


**Zadanie 2.23.** Dany jest czworokąt  $ABCD$  bez pary boków równoległych opisany na okręgu  $\omega$  o środku w punkcie  $I$ . Punkty  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$  i  $H_4$  to ortocentra trójkątów odpowiednio  $AIB$ ,  $BIC$ ,  $CID$  i  $DIA$ . Przekątne  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $O$ . Pokazać, że punkty  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ,  $H_4$  i  $O$  leżą na jednej prostej.

**Zadanie 2.24.** (Romanian Masters of Mathematics 2012) Okrągi: wpisany i opisany na trójkącie  $ABC$ , mają środki odpowiednio w punktach  $I$  i  $O$ . Okrąg  $\omega_a$  przechodzi przez punkty  $B$ ,  $C$  i jest styczny do okręgu wpisanego. Analogicznie definiujemy okręgi  $\omega_b$  i  $\omega_c$ . Pokazać, że środek potęgowy okręgów  $\omega_a$ ,  $\omega_b$  i  $\omega_c$  leży na prostej  $OI$ .

## 2.2 Dwustosunek i cztery lematy

W tym podrozdziale wyprowadzimy kilka lematów dotyczących dwustosunku. Fakty te są łatwe do udowodnienia, jednak ich znajomość przy rozwiązywaniu różnych zadań geometrycznych jest bardzo cenna. Pokażemy to na licznych przykładach.


**Lemat 2.25.** Dane są trzy punkty współliniowe  $A$ ,  $B$  i  $C$  takie, że punkt  $C$  jest środkiem odcinka  $AB$ . Pokaż, że  $(A, B; C, X_\infty) = 1$ .



rys. 23.

*Wskazówka.* Zastosuj definicję dwustosunku.


**Lemat 2.26** (Newton). Dane są cztery punkty  $A, C, B$  i  $D$  leżące w tej kolejności na jednej prostej. Punkt  $P$  jest środkiem odcinka  $AB$ . Pokaż, że  $(A, B; C, D) = 1$  wtedy i tylko wtedy gdy  $PA^2 = PC \cdot PD$ .



rys. 24.

*Wskazówka.* Po raz kolejny zastosuj definicję dwustosunku.

**Lemat 2.27.** W trójkącie  $ABC$  punkty  $X, Y$  i  $Z$  leżą odpowiednio na bokach  $BC, CA$  i  $AB$ . Prosta  $YZ$  przecina prostą  $AB$  w punkcie  $X'$ . Pokaż, że  $(B, C; X, X') = 1$  wtedy i tylko wtedy, gdy proste  $AX, BY$  i  $CZ$  przecinają się w jednym punkcie.




rys. 25.

*Dowód.* Jeśli proste  $AX, BY$  i  $CZ$  przecinają się w jednym punkcie to korzystając z twierdzenia Cevy oraz z twierdzenia Menelausa dla trójkąta  $ABC$  i punktów  $X, Y$  i  $Z$  mamy:  $\frac{BX}{XC} = \frac{BZ}{ZA} \cdot \frac{AY}{YC} = \frac{BX'}{CX'}$  czyli  $(B, C; X, X') = 1$ . Jeśli natomiast  $(B, C; X, X') = 1$  to korzystając z twierdzenia Menelausa mamy:  $\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{AY} \cdot \frac{AZ}{BZ} = \frac{BX'}{CX'} \cdot \frac{CY}{AY} \cdot \frac{AZ}{BZ} = 1$ , stąd na mocy twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Cevy uzyskujemy współpękowość prostych  $AX, BY$  i  $CZ$ .  $\square$

**Lemat 2.28.** Jeśli punkty  $A, C, B$  i  $D$  leżą w tej kolejności na jednej prostej  $k$ , oraz punkt  $X$  nie należy do  $k$  to dowolne dwa z trzech następujących warunków implikują trzeci:

- 1)  $(A, B; C, D) = 1$ .
- 2) Prosta  $XC$  jest dwusieczną kąta  $AXB$ .
- 3)  $XC \perp XD$ .



rys. 26.

*Dowód.* (\*) Załóżmy prawdziwość warunków 1) i 2). Rozważmy okrąg Apoloniusza punktów  $A$  i  $B$  o stosunku  $\lambda = \frac{XA}{XB}$ . Oznaczmy go przez  $o$ . Korzystając z warunku pierwszego mamy:  $\lambda = \frac{XA}{XB} = \frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$ , stąd prosta  $XD$  jest dwusieczną kąta zewnętrznego przy wierzchołku  $X$  trójkąta  $AXB$ . Zatem odcinek  $CD$  jest średnicą okręgu  $o$  czyli  $\angle CXD = 90^\circ$ .


(\*\*) Przyjmijmy, że prawdziwe są warunki 2) i 3). Wówczas proste  $XB$  i  $XD$  są dwusiecznymi odpowiednio kątów wewnętrznego i zewnętrznego przy wierzchołku  $X$  w trójkącie  $AXB$ . Warunek 1) jest konsekwencją twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego i zewnętrznego dla trójkąta  $AXB$ .

(\*\*\*) Niech wreszcie prawdziwe są warunki 3) i 1). Rozważmy okrąg Apoloniusza punktów  $A$  i  $B$  o stosunku  $\lambda = \frac{AC}{BC}$ . Oznaczmy go przez  $o$ . Z warunku pierwszego mamy  $\lambda = \frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD}$ , zatem  $CD$  jest średnicą okręgu  $o$ . Stąd punkt  $X$  należy do  $o$ , gdyż  $\angle CXD = 90^\circ$  a więc prosta  $XC$  dzieli kąt  $AXB$  na połowy.  $\square$



W poniższych zadaniach zauważymy, że niektóre z nich są tworzone na bazie lematów przedstawionych we wstępie.


**Zadanie 2.29.** W trójkącie  $ABC$  punkt  $D$  jest spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka  $A$  na podstawę  $BC$ . Punkty  $E$  i  $F$  leżą odpowiednio na bokach  $AC$  i  $AB$  tak, że proste  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$  przecinają się w jednym punkcie. Pokazać, że  $\angle ADF = \angle EDA$ .



rys. 27.

*Dowód.* Niech proste  $EF$  i  $BC$  przecinają się w punkcie  $T$  (jeśli  $AB = AC$  to  $T = X_\infty$  prostej  $BC$ ). Korzystając z lematu 2.27 mamy  $(B, C; D, T) = 1$ . Na mocy lematu 2.28 otrzymujemy tezę zadania.  $\square$


**Zadanie 2.30** (Twierdzenie o symedianie). W trójkącie  $ABC$  styczne do okręgu  $\omega$  opisanego na  $ABC$  w punktach  $B$  i  $C$  przecinają się w punkcie  $D$ . Udowodnić, że prosta  $AD$  jest symedianą w trójkącie  $ABC$ . *Uwaga.* Prosta  $AD$  jest symedianą, czyli prostą symetryczną do środkowej  $AM$  względem dwusiecznej kąta  $BAC$ .



rys. 28.

*Dowód.* Niech styczna do  $\omega$  w punkcie  $A$  oraz prosta  $AD$  przecinają prostą  $BC$  w punktach odpowiednio  $E$  i  $F$ . Oczywiście wiemy, iż punkt  $E$  jest biegunem prostej  $AD$  względem  $\omega$ . Zatem  $(B, C; F, E) = 1$ . Oznacza to, że pęk prostych  $AB, AC, AD, AE$  jest harmoniczny. Rozważmy obrazy tych prostych względem dwusiecznej kąta  $BAC$ . Obrazy te również będą tworzyć pęk harmoniczny, więc prosta  $BC$  przecina je w czterech punktach sprzężonych harmonicznie. Jednak po łatwym rachunku na kątach widzimy, że obraz prostej  $AE$  jest prostą równoległą do  $BC$  przechodzącą przez  $A$ . Stąd, jeśli oznaczymy punkt przecięcia obrazu prostej  $AD$  względem dwusiecznej kąta  $BAC$  z bokiem  $BC$  przez  $F'$ , to  $(B, C; F', X_\infty) = 1$ , czyli na mocy lematu 2.25 mamy równość  $BF' = F'C$ .  $\square$


**Zadanie 2.31.** Punkt  $M$  leży na przekątnej  $BD$  równoległoboku  $ABCD$ . Prosta  $AM$  przecina proste  $CD$  i  $BC$  w punktach odpowiednio  $K$  i  $N$ . Niech  $\omega_1$  będzie okręgiem o środku w punkcie  $M$  i promieniu  $AM$ . Niech  $\omega_2$  będzie okręgiem opisanym na trójkącie  $KCN$ . Okręgi  $\omega_1$  i  $\omega_2$  przecinają się w punktach  $P$  i  $Q$ . Pokazać, że proste  $MP$  i  $MQ$  są styczne do  $\omega_2$ .



rys. 29.

*Dowód.* Niech  $O$  będzie punktem przecięcia się przekątnych  $AC$  i  $BD$  równoległoboku  $ABCD$ . Odbijmy punkt  $A$  symetrycznie względem punktu  $M$ . Obraz ten oznaczmy przez punkt  $E$ . Łatwo zauważyć, że  $CE \parallel DB$ . Niech  $X_\infty$  oznacza punkt w nieskończoności prostej  $BD$ . Z lematu 2.25 wynika, że  $(B, D; O, X_\infty) = 1$ . Zatem pęk prostych  $C(D, B; O, X_\infty)$  jest harmoniczny, a ponieważ punkty  $K, N, A, E$  leżą odpowiednio na prostych  $CD, CB, CO$  i  $CE$ , więc  $(K, N; A, E) = 1$ . Korzystając z lematu 2.26 widzimy, że  $MA^2 = ME^2 = MK \cdot MN$ , czyli okręgi  $\omega_1$  i  $\omega_2$  są ortogonalne (prostopadłe), stąd łatwo uzyskujemy tezę zadania.  $\square$


**Zadanie 2.32.** (Iran 2004) W trójkącie  $ABC$  dwusieczna kąta przy wierzchołku  $A$  przecina prostą  $BC$  i okrąg opisany na trójkącie  $ABC$  odpowiednio w punktach  $D$  i  $M$ . Niech  $\omega$  będzie okręgiem o środku w punkcie  $M$  promieniu  $MB$ . Prosta  $l$  przechodząca przez punkt  $D$ , przecina  $\omega$  w punktach  $P$  i  $Q$ . Pokazać, że prosta  $AD$  jest dwusieczną kąta  $PAQ$ .



rys. 30.

*Dowód.* Oznaczmy okrąg o środku  $I$  wpisany w trójkąt  $ABC$  przez  $o$ , a okrąg opisany na trójkącie  $ABC$  przez  $o$ . Łatwo zauważyć, że  $\angle IBM = \angle DBI + \angle MBD = \angle IBA + \angle BAI = \angle BIM$ , zatem  $BM = IM$ . Analogicznie  $MI = IC$ . Stąd na okręgu  $\omega$  leży punkt  $I$ . Podobnie możemy pokazać, iż na okręgu  $\omega$  leży środek  $O$  okręgu dopisanego do trójkąta  $BAC$ , stycznego do prostej  $BC$  (to są bardzo ważne fakty). Korzystając z lematu 2.28 łatwo zauważyć, że  $(A, D; I, O) = 1$ . Zatem biegunową  $k$  punktu  $D$  względem  $\omega$  jest prosta prostopadła do  $AD$  i przechodząca przez punkt  $A$ . Jednakże prosta  $k$  jest dwusieczną kąta zewnętrznego trójkąta  $ABC$  przy wierzchołku  $A$ . Jeśli prosta  $l$  przetnie prostą  $k$  w punkcie  $S$ , to skoro  $k$  jest biegunową punktu  $D$  względem  $\omega$ , to  $(P, Q; D, S) = 1$ . Zatem ponownie korzystając z lematu 2.28 otrzymujemy tezę zadania.  $\square$

**Zadanie 2.33.** (Baltic Way 2009) Niech  $M$  będzie środkiem boku  $AC$  trójkąta  $ABC$ , a  $K$  — punktem półprostej  $BA$  leżącym poza odcinkiem  $BA$ . Prosta  $KM$  przecina bok  $BC$  w punkcie  $L$ , a  $P$  jest takim punktem odcinka  $BM$ , że półprosta  $PM$  jest dwusieczną kąta  $LPK$ . Prosta  $l$  jest równoległa do  $BM$  i przechodzi przez punkt  $A$ . Wykazać, że rzut prostopadły punktu  $M$  na prostą  $l$  leży na prostej  $PK$ .




rys. 31.

*Dowód.* Przez punkt  $P$  poprowadźmy prostą  $k$  prostopadłą do prostej  $BM$ . Przecięcie prostych  $k$  i  $KL$  oznaczmy przez  $S$  (jeśli  $k \parallel KL$ , to teza zadania jest oczywista). Na mocy lematu 2.28 otrzymujemy  $(K, L; M, S) = 1$ . Zatem  $B(K, L; M, S) = 1$ , ale punkt  $M$  jest środkiem odcinka  $AC$ , więc korzystając z lematu 2.25 mamy  $BS \parallel AC$ . Jeśli prosta  $PK$  przecina  $l$  w punkcie  $W$ , to łatwo zauważamy, że  $\frac{KW}{WP} = \frac{KA}{AB} = \frac{KM}{MS}$ , zatem  $WM \parallel PS$ , czyli  $WM \perp l$  -  $W$  jest rzutem punktu  $M$  na prostą  $l$ , który oczywiście leży na prostej  $PK$ .  $\square$

**Zadanie 2.34.** (Iran 2009) W trójkącie  $ABC$  okrąg wpisany o środku  $I$  jest styczny w punktach  $D, E$  i  $F$  do boków odpowiednio  $BC, CA$  i  $AB$ . Punkt  $M$  to rzut prostokątny punktu  $D$  na prostą  $EF$ . Niech  $P$  będzie środkiem odcinka  $DM$ . Wykazać, że jeśli  $H$  jest ortocentrum w trójkącie  $BIC$  to prosta  $PH$  połowi odcinek  $EF$ .


*Dowód.* Wykażemy najpierw lemat.

**Lemat 2.35.** W tej konfiguracji niech prosta  $BI$  przecina prostą  $EF$  w punkcie  $S$ . Wówczas  $BS \perp SC$ .



rys. 32.

*Dowód lematu.* Przyjmijmy, że prosta  $EF$  przecina prostą  $BC$  w punkcie  $T$  (jeśli  $EF \parallel BC$  to  $T = X_\infty$  prostej  $BC$ ). Korzystając z lematu 2.27 otrzymujemy  $(T, D; B, C) = 1$ . Łatwo zauważyć, że trójkąty  $BSD$  i  $FSB$  są przystające, stąd  $\angle FSB = \angle BSD$ . Na mocy lematu 2.28 otrzymujemy tezę.




rys. 33.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Niech proste  $BI$  i  $CI$  przecinają prostą  $EF$  w punktach odpowiednio  $Q$  i  $R$ . Z powyższego lematu uzyskujemy zależności  $BR \perp RC$  i  $BQ \perp QC$ . Stąd punkt  $H$  jest punktem przecięcia prostych  $BR$  i  $CQ$ . Jednocześnie punkt  $I$  jest ortocentrum trójkąta  $BHC$ . Niech proste  $AI$  i  $HD$  przecinają prostą  $EF$  w punktach odpowiednio  $W$  i  $Z$ . Teza zadania sprowadza się do pokazania współliniowości punktów

$P, W$  i  $H$ . Korzystając z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Menelausa widzimy, że wystarczy pokazać zależność  $\frac{DP}{PM} \cdot \frac{MW}{WZ} \cdot \frac{HZ}{HD} = 1$ , czyli  $\frac{MW}{WZ} = \frac{HZ}{HD}$ . Skoro  $AI \parallel MD$ , to  $\frac{MW}{WZ} = \frac{ID}{IZ}$ , łącząc to z powyższym związkiem wystarczy pokazać  $(H, I; Z, D) = 1$ . Jednakże na mocy lematu 2.27  $(H, Q; K, C) = 1$ , gdzie  $K$  to punkt przecięcia prostych  $BZ$  i  $HC$ . Zatem  $B(H, Q; K, C) = 1$ , czyli  $(H, I; Z, D) = 1$ .  $\square$


**Zadanie 2.36.** (Twierdzenie Googo). Dany jest czworokąt  $ABCD$  opisany na okręgu  $\omega$  o środku w punkcie  $I$ . Punkt  $T$  jest rzutem punktu  $I$  na prostą  $BD$ . Udowodnić, że prosta  $BD$  jest dwusieczną kąta  $ATC$ .



rys. 34.

*Dowód.* Niech okrąg  $\omega$  będzie styczny do boków  $AB, BC, CD$  i  $DA$  odpowiednio w punktach  $E, F, G$  i  $H$ . Korzystając z zadania 2.2 wiemy, że proste  $HG, EF$  i  $AC$  przecinają się w jednym punkcie  $P$  oraz, że proste  $BD, AC, HF$  i  $FG$  są współpękowe (oznaczmy ich punkt przecięcia przez  $S$ ). Łatwo zauważamy, że  $(A, C; S, P) = 1$ . Korzystając z twierdzenia 1.11 widzimy, że prosta  $BD$  jest biegunową punktu  $P$  względem  $\omega$ . Zatem  $PI \perp BD$ . Stąd punkt  $T$  jest punktem przecięcia prostych  $BD$  i  $PI$ . Teza zadania jest konsekwencją lematu 2.28.  $\square$


**Zadanie 2.37.** (LVI Olimpiada Matematyczna) Okrąg o środku  $I$  jest wpisany w czworokąt wypukły  $ABCD$ , przy czym punkt  $I$  nie leży na prostej  $AC$ . Przekątne  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $E$ . Prosta przechodząca przez punkt  $E$  oraz prostopadła do prostej  $BD$  przecina proste  $AI, CI$  odpowiednio w punktach  $P$  i  $Q$ . Wykazać, że  $PE = EQ$ .



rys. 35.

*Dowód.* Korzystając z twierdzenia Menelausa dla trójkąta  $PIQ$  przeciętego prostą  $AC$  mamy:  $\frac{EP}{EQ} = \frac{IC}{CQ} \cdot \frac{AP}{AI}$ . Zatem wystarczy pokazać, że  $\frac{IC}{CQ} \cdot \frac{AP}{AI} = 1$ . Niech punkty  $K, L$  i  $M$  będą rzutami punktów odpowiednio  $A, C$  i  $I$  na prostą  $BD$ . Wówczas równość którą mamy pokazać jest równoważna temu, że punkty  $K, L, E$  i  $M$  tworzą czwórkę harmoniczną. Lecz jest to prawdą gdyż, korzystając z dowodu twierdzenia Googo uzyskujemy iż punkt przecięcia prostych  $MI$  i  $AC$  wraz z punktami  $A, E$  i  $C$  tworzą czwórkę harmoniczną, a punkty  $K, L, E$  i  $M$  są ich rzutami prostokątnymi na prostą  $BD$ .  $\square$


**Zadanie 2.38.** (Chiny 2002) Dany jest czworokąt wypukły  $ABCD$ . Niech  $E = AB \cap CD, F = AD \cap BC$  i  $P = AC \cap BD$ . Punkt  $O$  jest rzutem prostokątnym punktu  $P$  na prostą  $EF$ . Pokazać, że  $\angle BOC = \angle AOD$ .



rys. 36.

*Dowód.* Przyjmijmy, że  $S = AC \cap EF$  i  $T = BD \cap EF$ . Korzystając z lematu 2.27 widzimy, że  $(E, F; T, S) = 1$ . Stąd  $(T, P; D, B) = 1$  oraz  $(A, C; P, S) = 1$  gdyż odpowiednio  $A(E, F; T, S) = 1$  i  $B(E, F; T, S) = 1$ . Pamiętajmy o tym, że  $OP \perp EF$  na mocy lematu 2.28 oraz powyższych związków mamy  $\angle DOP = \angle POB$  i  $\angle AOP = \angle POC$ . Stąd  $\angle BOC = \angle POC - \angle POB = \angle AOP - \angle DOP = \angle AOD$ .  $\square$


**Zadanie 2.39.** Dany jest czworokąt wypukły  $ABCD$ . Niech  $Q = AB \cap CD$ ,  $R = AD \cap BC$  i  $P = AC \cap BD$ . Prosta równoległa do prostej  $QR$  przechodząca przez punkt  $P$  przecina proste  $AB$  i  $CD$  w punktach odpowiednio  $X$  i  $Y$ . Wykazać, że punkt  $P$  jest środkiem odcinka  $XY$ .



rys. 37.

*Dowód.* Korzystając z lematu 2.25 wystarczy pokazać, że pęk prostych  $QA$ ,  $QD$ ,  $QP$  i  $QR$  jest harmoniczny. Jednakże, na mocy lematu 2.27 jest to oczywiście prawdą.  $\square$


**Zadanie 2.40.** (Twierdzenie o motylku) Dany jest okrąg  $\omega$  oraz cięciwa  $EF$ . Niech  $P$  będzie środkiem odcinka  $EF$ . Cięciwy  $AC$  i  $BD$  przechodzą przez punkt  $P$ . Proste  $AD$  i  $BC$  przecinają cięciwę  $EF$  w punktach odpowiednio  $X$  i  $Y$ . Wykazać, że  $PX = PY$ .



rys. 38.

*Dowód.* Przyjmijmy  $Q = AB \cap CD$  oraz  $R = AC \cap BD$  (jeśli cięciwa  $EF$  jest średnicą  $\omega$  lub  $AB \parallel CD$  to teza zadania jest oczywista). Niech  $O$  będzie środkiem okręgu  $\omega$ . Z tezy zadania 2.4 wynika, że  $O$  jest ortocentrum trójkąta  $PQR$ . Mamy więc  $QR \perp OP \perp EF$  i stąd  $EF \parallel QR$ . Teza poprzedniego zadania kończy dowód.  $\square$

**Zadanie 2.41.** (Autorskie) W trójkącie  $ABC$  okrąg wpisany  $\omega$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Punkt  $S$  jest rzutem prostokątnym punktu  $D$  na odcinek  $EF$ . Prosta  $EF$  przecina prostą  $BC$  w punkcie  $T$ . Prosta  $AS$  przecina okrąg opisany na trójkącie  $ABC$  w punkcie  $P$ . Pokazać, że punkty  $T$ ,  $S$ ,  $D$ ,  $P$  leżą na jednym okręgu.



rys. 39.


*Dowód.* Łatwo zauważyć, że wystarczy pokazać równość  $\angle DPT = 90^\circ$ . Korzystając z lematu 2.27  $(T, D; B, C) = 1$ . Stąd na mocy lematu 2.28 pozostaje udowodnić, że prosta  $PD$  jest dwusieczną kąta  $CPB$ . Ponownie stosując lemat 2.28 widzimy, że  $\angle BSD = \angle DSC$  lub też  $\angle FSB = \angle CSE$ . Korzystając z twierdzenia o dwusiecznej i z twierdzenia sinusów mamy:  $\frac{BP}{PC} = \frac{\sin \angle BCP}{\sin \angle PBC} = \frac{\sin \angle BAP}{\sin \angle PAC} = \frac{FS}{SE}$ . Jednakże, trójkąty  $FSB$  i  $SEC$  są podobne, przeto  $\frac{BP}{PC} = \frac{FS}{SE} = \frac{SB}{SC} = \frac{BD}{DC}$ . Zatem na mocy twierdzenia o dwusiecznej wnosimy, że prosta  $PD$  jest dwusieczną kąta  $CPB$  co było do pokazania.  $\square$

**Zadanie 2.42.** (Mediterranean Mathematics Olympiad 2011) W trójkącie  $ABC$  punkt  $D$  jest punktem przecięcia dwusiecznej kąta przy wierzchołku  $A$  z bokiem  $BC$ . Punkty  $I_1$  i  $I_2$  są środkami okręgów wpisanych w odpowiednio trójkąty  $ABD$  i  $ADC$ . Prosta  $I_1I_2$  przecina proste  $AB$  i  $AC$  odpowiednio w punktach  $F$  i  $E$ . Wykazać, że proste  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$  przecinają się w jednym punkcie.

*Dowód.* Rozpoczniemy od sformułowania przydatnego faktu, którego łatwy dowód pozostawiamy czytelnikowi.

**Lemat 2.43.** Dane są dwa różne okręgi  $o_1$  i  $o_2$  o środkach odpowiednio  $O_1$  i  $O_2$ . Niech punkty  $P$  i  $Q$  będą środkami odpowiednio jednokładności zewnętrznej i wewnętrznej okręgów  $o_1$  i  $o_2$ . Wykazać, że

$$(P, Q; O_1, O_2) = 1.$$




rys. 40.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Niech prosta  $I_1I_2$  przecina proste  $BC$  i  $AD$  odpowiednio w punktach  $S$  i  $T$  (jeśli  $I_1I_2 \parallel BC$  teza zadania jest oczywista). Łatwo zauważamy, że punkty  $S$  i  $T$  to środki odpowiednio jednokładności zewnętrznej i wewnętrznej okręgów  $o_1$  i  $o_2$ . Zatem na mocy powyższego lematu  $(S, T; I_1, I_2) = 1$ . Stąd pęk prostych  $A(S, T; I_1, I_2) = 1$ . Jednakże  $\angle I_1AD = \angle DAI_2$ , więc na mocy lematu 2.28 -  $TA \perp AD$ . Skoro  $\angle BAD = \angle DAC$ , to korzystając ponownie z lematu 2.28 mamy  $(S, D; B, C) = 1$ . Ostatecznie stosując lemat 2.27 uzyskujemy tezę zadania.  $\square$

**Zadanie 2.44.** (Autorskie) Dany jest punkt  $P$  wewnątrz trójkąta  $ABC$ . Okręgi  $\omega_1$  i  $\omega_2$  o środkach odpowiednio  $O_1$  i  $O_2$  są opisane na trójkątach  $APB$  i  $APC$  w tej kolejności. Prosta  $CO_1$  przecina  $\omega_1$  w punktach  $K$  i  $L$  ( $K$  leży bliżej punktu  $P$  niż  $L$ ) oraz  $\omega_2$  w punkcie  $S$ . Analogicznie prosta  $BO_2$  przecina  $\omega_2$  w punktach  $M$  i  $N$  ( $M$  leży bliżej punktu  $P$  niż  $N$ ) oraz  $\omega_1$  w punkcie  $T$ . Niech punkty  $X, Y, Z$  będą takie, że  $X = BS \cap CT$ ,  $Y = BK \cap CM$  i  $Z = LB \cap NC$ . Pokazać, że jeśli  $\angle BPC - \angle BAC = 90^\circ$ , to punkty  $X, Y$  i  $Z$  leżą na jednej prostej.


*Dowód.* Pokażemy najpierw lemat:

**Lemat 2.45.** Dane są dwa ortogonalne (prostopadłe) okręgi  $o_1$  i  $o_2$  o środkach odpowiednio  $O_1$  i  $O_2$ . Prosta przechodząca przez  $O_1$  przecina okrąg  $o_1$  w punktach  $A$  i  $B$ , a okrąg  $o_2$  w punktach  $C$  i  $D$ . Wykazać, że  $(A, B; C, D) = 1$ .



rys. 41.


*Dowód.* Przyjmijmy, że punkty przecięcia leżą w kolejności  $A, C, B$  i  $D$ . Na mocy lematu 2.26 wystarczy pokazać, że  $O_1A^2 = O_1C \cdot O_1D$ , jednakże jest to oczywiste, gdyż okręgi  $o_1$  i  $o_2$  są ortogonalne.  $\square$



rys. 42.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Po prostym rachunku na kątach widzimy, że równość  $\angle BPC - \angle BAC = 90^\circ$  implikuje nam ortogonalność okręgów  $\omega_1$  i  $\omega_2$ . Na podstawie powyższego lematu mamy  $(B, T; M, N) = (L, K; S, C) = 1$ . Jednakże odcinki  $KL$  i  $MN$  to średnice odpowiednio okręgów  $\omega_1$  i  $\omega_2$ , stąd na mocy lematu 2.28 mamy równości  $\angle SBK = \angle KBC$  oraz  $\angle TCM = \angle MCB$ . Zatem punkt  $Y$  jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt  $BXC$ . Ostatecznie skoro  $BK \perp BZ$  i  $CM \perp CZ$ , przeto proste  $BZ$  i  $CZ$  są dwusiecznymi kątów zewnętrznych trójkąta  $BXC$  przy wierzchołkach odpowiednio  $B$  i  $C$ . Stąd punkt  $Z$  jest środkiem okręgu dopisanego do trójkąta  $BXC$ , stycznego do prostej  $BC$ . Punkty  $X, Y$  i  $Z$  leżą więc na jednej prostej, która jest dwusieczną kąta  $BXC$ .  $\square$

**Zadanie 2.46.** W trójkącie  $ABC$  okrąg przechodzący przez punkty  $B$  i  $C$  jest styczny do okręgu  $\omega$  wpisanego w trójkąt  $ABC$  w punkcie  $D$ . Okrąg dopisany do trójkąta  $ABC$  styczny jest do boku  $BC$  w punkcie  $E$ . Prosta  $AE$  przecina  $\omega$  w punkcie  $F$  leżącym bliżej punktu  $A$ . Wykazać, że  $\angle FDA = \angle EDF$ .




rys. 43.

*Dowód.* Przyjmijmy, że  $\omega$  jest styczny do boków  $BC, CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $X, Y$  i  $Z$ . Oznaczmy okrąg przechodzący punkty  $B$  i  $C$  i styczny do  $\omega$  przez  $o$ . Niech wspólna styczna okręgów  $\omega$  i  $o$  przecina bok  $BC$  w punkcie  $S$ . Korzystając z twierdzenia o potęgze punktów otrzymujemy:  $SX^2 = SD^2 = SB \cdot SC$ . Oznaczmy przez  $X'$  punkt symetryczny do punktu  $X$  względem punktu  $S$ . Na mocy lematu Newtona wnosimy, że  $(X', X; B, C) = 1$ . Zatem punkt  $X'$  na podstawie lematu 2.27 leży na prostej  $YZ$ . Jednokładność o środku w punkcie  $D$ , przeprowadza prostą  $BC$  na prostą styczną do  $o$  w środku  $W$  łuku  $BC$  niezawierającego punktu  $W$ .



Stąd punkty  $D$ ,  $X$  i  $W$  leżą na jednej prostej i prosta  $DX$  jest dwusieczną kąta  $BDC$ . Jednakże  $(X', X; B, C) = 1$ , więc na mocy lematu 2.28 otrzymujemy, że proste  $X'D$  i  $DX$  są prostopadłe. Niech  $X'D$  przecina  $\omega$  w punkcie  $F'$ . Pokażemy, że  $F = F'$ . Skoro  $XDF' = 90^\circ$  to wystarczy pokazać, że  $FX$  jest średnicą okręgu  $\omega$ . Rzeczywiście, jednokładność o środku w  $A$  przeprowadza średnicę okręgu  $\omega$  na średnicę okręgu dopisanego trójkąta  $ABC$  stycznego do boku  $BC$  w punkcie  $E$ . Stąd odcinek  $XF$  jest średnicą okręgu  $\omega$ , zatem  $F = F'$ . Niech teraz proste  $AD$  i  $AX$  przecinają proste odpowiednio  $BC$  i  $DF$  w punktach  $Q$  i  $R$  w tej kolejności. Z twierdzenia 1.11 wynika, że  $X'$  jest biegunem prostej  $AX$  względem  $\omega$ . Stąd mamy zależność  $A(X', R; D, F) = 1$ , z której implikuje równość  $(X', X; Q, E) = 1$ . Zatem  $D(X', X; Q, E) = 1$ , czyli  $(F, T; A, E) = 1$ , gdzie  $T$  jest punktem przecięcia prostych  $DX$  i  $AE$ . Jednakże  $\angle TDF = 90^\circ$ , więc korzystając ponownie z lematu 2.28 mamy  $\angle ADF = \angle FDE$  - czyli tezę zadania.  $\square$

**Zadanie 2.47.** (IMO Shortlist 2002) W trójkącie  $ABC$  okrąg wpisany  $\omega$  jest styczny do boku  $BC$  w punkcie  $K$ . Punkt  $D$  jest spodkiem wysokości trójkąta  $ABC$  opuszczonej z wierzchołka  $A$ . Punkt  $M$  jest środkiem odcinka  $AD$ . Prosta  $KM$  przecina  $\omega$  w punkcie  $N$ . Pokazać, że okrąg opisany na trójkącie  $BNC$  jest styczny do  $\omega$ .



rys. 44.

*Dowód.* Jeśli  $AB = AC$ , to teza zadania jest oczywista. Załóżmy dalej, że  $AB \neq AC$ . Niech okrąg  $o$  będzie okręgiem przechodzącym przez punkty  $B$  i  $C$  oraz styczny do  $\omega$  w punkcie  $N'$ . Wystarczy pokazać, że  $N = N'$ . Załóżmy nie wprost, że  $N \neq N'$ . Przyjmijmy, że okrąg dopisany do trójkąta  $ABC$  styczny jest do boku  $BC$  w punkcie  $E$ , oraz że punkt  $L$  jest drugim końcem średnicy  $KL$  okręgu  $\omega$ . Wykażemy najpierw, że  $\angle LNA = \angle ENL$ . Podobnie jak w poprzednim zadaniu dowodzimy, że punkty  $A, L, E$  leżą na jednej prostej. Niech prosta  $NK$  przecina prostą  $AE$  w punkcie  $S$ , ponieważ  $\angle KNL = 90^\circ$ , to na mocy lematu 2.28 wystarczy pokazać, że  $(S, L; A, E) = 1$ . Czyli, że pęk prostych  $M(S, L; A, E) = 1$  lub też  $(W, K; D, E) = 1$  gdzie  $W = LM \cap BC$ . Korzystając z lematu 2.27 widzimy iż, związek  $(W, K; D, E) = 1$  jest równoważny współpękowości prostych  $AK$ ,  $DL$  i  $EM$ . Jednakże czworokąt  $ALKD$  jest trapezem prostokątnym, więc na mocy twierdzenia Talesa w łatwy sposób otrzymamy, że prosta  $EP$  dzieli odcinki  $LK$  i  $AD$  na połowy (gdzie  $P = LD \cap AK$ ). Stąd oczywiście uzyskujemy, iż proste  $AK$ ,  $DL$  i  $EM$  przecinają się w jednym punkcie, zatem  $\angle LNA = \angle ENL$ . Na mocy poprzedniego zadania  $\angle LN'A = \angle EN'L$ . Powyższe równości oznaczają, że okrąg przechodzący przez punkty  $N, N'$  i  $L$  (czyli okrąg  $\omega$ ) jest pewnym okręgiem Apoloniusza punktów  $A$  i  $E$ . Jest to sprzeczność, bo środek tego okręgu nie leży na prostej  $AE$ . Kończy to dowód nie wprost.  $\square$

Zadania do samodzielnego rozwiązania.

**Zadanie 2.48.** (Baltic Way 2002) Niech  $L, M$  i  $N$  będą takimi punktami odpowiednio na bokach  $AC, AB$  i  $BC$  trójkąta  $ABC$ , że  $BL$  jest dwusieczną kąta  $ABC$  oraz odcinki  $AN, BL$  i  $CM$  mają punkt wspólny. Udowodnić, że jeśli  $\angle ALB = \angle MNB$ , to  $\angle LNM = 90^\circ$ .

**Zadanie 2.49.** Czworokąt  $ABCD$  jest wpisany w okrąg  $\omega$ . Odcinek  $AC$  jest średnicą  $\omega$  oraz  $AC \perp BD$ . Punkt  $M$  jest środkiem odcinka  $AD$ . Prosta prostopadła do prostej  $BM$  przechodząca przez punkt  $C$  przecina prostą  $AD$  w punkcie  $P$ . Pokazać, że prosta  $BP$  jest styczna do okręgu  $\omega$ .

**Zadanie 2.50.** Dany jest półokrąg  $\omega$  o średnicy  $AB$  i punkt  $C$  leżący na  $\omega$ . Styczne do  $\omega$  w punktach  $A$  i  $C$  przecinają się w punkcie  $D$ . Na prostej  $AB$  obieramy punkt  $H$  taki, że  $CH \perp AB$ . Prosta  $CH$  przecina prostą  $BD$  w punkcie  $K$ . Pokazać, że  $HK = KC$ .

**Zadanie 2.51.** Okrąg  $\omega$  o środku  $I$  wpisany w trójkąt  $ABC$  jest styczny do boków  $AB$  i  $AC$  w punktach odpowiednio  $F$  i  $E$ . Niech  $M$  będzie środkiem odcinka  $BC$ . Proste  $EF$  i  $AM$  przecinają się w punkcie  $N$ . Proste  $BI$  i  $CI$  przecinają okrąg o średnicy  $BC$  w punktach odpowiednio  $X$  i  $Y$ . Pokazać, że  $\frac{NX}{NY} = \frac{AC}{AB}$ .

**Zadanie 2.52.** (Zwardoń 2008)  $ABCD$  jest czworokątem wypukłym, w którym prosta  $AC$  jest dwusieczną kąta  $BAD$ . Punkt  $E$  leży na odcinku  $CD$ , a  $F$  jest przecięciem  $BE$  i  $AC$ . Odcinek  $DF$  przedłużamy do przecięcia z bokiem  $BC$  w punkcie  $G$ . Wykazać, że  $\angle GAC = \angle EAC$ .

**Zadanie 2.53.** (Tuymaada 2010) Okrąg  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  jest wpisany w trójkąt  $ABC$ . Punkt  $P$  jest taki, że  $PI \perp BC$  oraz  $PA \parallel BC$ . Punkty  $Q$  i  $R$  leżą na bokach odpowiednio  $AB$  i  $AC$  tak, że  $QR \parallel BC$  oraz prosta  $QR$  jest styczna do  $\omega$ . Pokazać, że  $\angle QPB = \angle CPR$ .

**Zadanie 2.54.** (XLIX Olimpiada Matematyczna) W trójkącie  $ABC$  kąt  $BCA$  jest rozwarty oraz  $\angle BAC = 2\angle ABC$ . Prosta przechodząca przez punkt  $B$  i prostopadła do  $BC$  przecina prostą  $AC$  w punkcie  $D$ . Punkt  $M$  jest środkiem boku  $AB$ . Dowieść, że  $\angle AMC = \angle BMD$ .

**Zadanie 2.55.** (LVII Olimpiada Matematyczna) W czworokącie  $ABCD$  miara kąta wewnętrznego przy wierzchołku  $A$  jest większa od  $180^\circ$  oraz zachodzi równość  $AB \cdot CD = AD \cdot BC$ . Punkt  $P$  jest symetryczny do punktu  $A$  względem prostej  $BD$ . Udowodnić, że  $\angle PCB = \angle ACD$ .

**Zadanie 2.56.** Punkt  $O$  jest środkiem okręgu opisanego na nierównoramiennym trójkącie  $ABC$ . Okrąg wpisany  $\omega$  w trójkąt  $ABC$  jest styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D$ ,  $E$  i  $F$ . Przypuśćmy, że  $P = DE \cap AB$ ,  $Q = DF \cap AC$ ,  $R = EF \cap BC$ ,  $M$  i  $N$  - środki odcinków  $QE$  i  $PF$  odpowiednio. Pokazać, że proste prostopadłe przechodzące przez punkty  $O$ ,  $P$  i  $Q$  do prostych odpowiednio  $MN$ ,  $CF$  i  $BE$  przecinają się w jednym punkcie.

**Zadanie 2.57.** Dany jest czworokąt  $ABCD$  wpisany w okrąg  $\omega$ . Styczne do  $\omega$  w punktach  $A$  i  $C$  przecinają się w punkcie  $E$ , styczne do  $\omega$  w punktach  $B$  i  $D$  przecinają się w punkcie  $F$ ,  $S = AC \cap BD$ , punkty  $M$  i  $N$  to środki odpowiednio przekątnych  $AC$  i  $BD$ . Pokazać, że następujące warunki są równoważne:

- 1)  $AB \cdot CD = BC \cdot AD$ .
- 2)  $E \in BD$ .
- 3)  $F \in AC$ .
- 4) Punkt  $S$  jest punktem przecięcia przekątnej czworokąta  $ABCD$  z symedianą co najmniej jednego z trójkątów  $BCD$ ,  $CDA$ ,  $DAB$ ,  $ABC$  poprowadzonej z punktów odpowiednio  $A$ ,  $B$ ,  $C$  lub  $D$ .
- 5)  $(A, C; S, F) = 1$ .
- 6)  $(B, D; S, E) = 1$ .
- 7)  $\angle ADM = \angle CDB$ .
- 8)  $\angle BCN = \angle DCA$ .

*Uwaga.* Powyższe zadanie przedstawia najważniejsze własności czworokąta harmonicznego. Znajomość tych faktów może okazać się bardzo przydatna na zawodach matematycznych.

## 3 Rozwiązania

### 3.1 Biegunowe

**Rozwiązanie 2.15.** Niech proste  $AB$  i  $PQ$  oraz  $BP$  i  $AQ$  przecinają się odpowiednio w punktach  $T$  i  $W$  (jeśli  $AB \parallel PQ$  teza zadania jest oczywista). Korzystając z twierdzenia 1.11 oraz twierdzenia 1.10 łatwo uzyskujemy, że punkty  $S$ ,  $R$  i  $W$  leżą na biegunowej punktu  $T$  względem  $\omega$ , co kończy rozwiązanie.

**Rozwiązanie 2.16.** Na podstawie twierdzenia 1.11 uzyskujemy, że punkt  $S$  jest biegunem prostej  $BD$  względem  $\omega$ , zatem  $SO \perp BD$ .

**Rozwiązanie 2.17.** Przyjmijmy, że punkty  $N$  i  $P$  leżą odpowiednio na prostych  $AC$  i  $AB$ . Niech okrąg  $\omega$  będzie styczny do boków  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  w punktach  $D$ ,  $E$  i  $F$  w tej kolejności. Pokażemy, że punkty  $M$ ,  $N$  i  $P$  leżą na prostej stycznej do  $\omega$ . Przez punkty  $E$  i  $F$  poprowadźmy prostopadłe do prostych odpowiednio  $IN'$  oraz  $IP'$ , ich punkt przecięcia oznaczmy przez  $S$ . Po łatwym rachunku na kątach uzyskujemy, że  $\angle ESF = \angle PIN = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle FPN - \frac{1}{2}\angle PNE = 180^\circ - \frac{1}{2}(360^\circ - \angle APN - \angle ANP) = 90^\circ - \angle BAC = \angle AEF$ , stąd punkt  $S$  należy do  $\omega$ . Analogicznie dowodzimy, że prosta prostopadła do prostej  $IM'$  poprowadzona z punktu  $D$  przechodzi przez punkt  $S$ . Zatem łatwo widzimy, że proste  $DS$ ,  $FS$  i  $ES$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $M$ ,  $N$  i  $P$ , stąd na mocy wniosku 1.13 punkty te leżą na jednej prostej stycznej do  $\omega$  w punkcie  $S$ .

**Rozwiązanie 2.18.** Teza zadania jest konsekwencją lematu 2.10.

**Rozwiązanie 2.19.** Niech okrąg  $\omega$  opisany na trójkącie  $AEF$  przecina po raz drugi  $o$  w punkcie  $S$ . Wiadomo, iż punkty  $B, C, E$  i  $F$  leżą na jednym okręgu. Na mocy twierdzenia o trzech osiach potegowych otrzymujemy, że proste  $AS, EF$  i  $BC$  przecinają się w jednym punkcie  $X$ . Korzystając ponownie z twierdzenia o trzech osiach widzimy, że styczna do  $o$  w punkcie  $A_1$  przechodzi przez punkt  $X$ . Analogicznie definiujemy punkty  $Y$  i  $Z$ . Teza zadania sprowadza się do zadania 2.8.

*Uwaga.* Na mocy lematu 2.27 mamy  $(X, D; B, C) = 1$ . Stąd prosta  $A_1D$  jest biegunową punktu  $X$  względem  $\omega$ . Analogicznie dowodzimy, iż proste  $B_1E$  i  $C_1F$  są biegunowymi punktów odpowiednio  $Y$  i  $Z$  względem  $\omega$ . Skoro punkty  $X, Y$  i  $Z$  są współliniowe, przeto proste  $A_1D, B_1E, C_1F$  przecinają się w punkcie będącym biegunem prostej przechodzącej przez punkty  $X, Y$  i  $Z$  względem  $\omega$ . Jeśli punkty  $O$  i  $H$  to środek okręgu opisanego i ortocentrum odpowiednio trójkąta  $ABC$ , to łatwo pokazać, że  $XZ \perp OH$  (korzystając z twierdzeń o potędze punktu względem okręgu). Zatem proste  $A_1D, B_1E, C_1F$  przecinają się na prostej Eulera trójkąta  $ABC$ .

**Rozwiązanie 2.20.** Na podstawie wniosku 1.13 wystarczy pokazać, że bieguny prostych  $MN, EF$  i  $CI$  leżą na jednej prostej. Korzystając z lematu 2.14 biegunem prostej  $MN$  jest ortocentrum  $H$  trójkąta  $BIC$ . Biegunem prostej  $DF$  jest oczywiście punkt  $B$ . Prosta  $CI$  ma biegun w punkcie  $X_\infty$  o kierunku  $BD$ . Jednakże współliniowość punktów  $H, B$  i  $X_\infty$  jest oczywista.

*Uwaga.* Rozwiązanie zadania można znacznie skrócić, jednak nie angażowałoby to metod opisanych w pracy.

**Rozwiązanie 2.21.** Zaczniemy od sformułowania następującego lematu:

**Lemat 3.1.** W trójkącie  $ABC$  okrąg  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  dopisany do boku  $BC$  trójkąta  $ABC$  jest styczny do prostych  $BC, CA$  i  $AB$  odpowiednio w punktach  $D, E$  i  $F$ . Punkty  $M$  i  $N$  są środkami boków odpowiednio  $AB$  i  $AC$ . Wówczas ortocentrum trójkąta  $BIC$  jest biegunem prostej  $MN$  względem  $\omega$ .

*Wskazówka.* Czytelnik z łatwością zauważy analogie pomiędzy tym lematem a lematem 2.14.

Przejdźmy do właściwej części rozwiązania. Oznaczmy przez  $H$  ortocentrum trójkąta  $BIC$ . Skoro punkty  $P, Q$  i  $H$  są współliniowe to na mocy wniosku 1.13 ich biegunowe względem  $\omega$  przecinają się w jednym punkcie. Zatem styczna w punkcie  $Q$  do  $\omega$  oraz proste  $MN$  i  $DE$  są współpękowe, co oczywiście kończy rozwiązanie.

*Uwaga.* Rozważana konfiguracja pozwala nam otrzymać wiele ciekawych rezultatów. Proponujemy czytelnikowi pokazanie ich w ramach treningu. Oto kilka z nich:

- 1) Prosta  $AH$  jest biegunową punktu  $S = MN \cap EF$  względem  $\omega$ .
- 2) Proste  $DE, BI$  i  $MN$  są współpękowe.
- 3) Odbicie  $H_2$  względem środka odcinka  $BC$  to środek okręgu dopisanego do boku  $BC$ .
- 4) Odbicie  $H$  względem środka odcinka  $BC$  to punkt  $I$ .
- 5) Podobnie skonstruowane proste  $HH_2$  dla trójkąta  $ABC$  tną się w jednym punkcie będącym punktem Nagela ( $X_8$ ) trójkąta  $ABC$ .
- 6) Jeśli punkty  $S_1$  i  $S_2, S_3$  to ortocentra odpowiednio trójkątów  $BIC, CIA$  i  $AIB$  to powstałe trójkąty  $AS_2S_3, BS_1S_3$  i  $CS_1S_2$  mają wspólne ortocentrum - jest nim punkt Nagela trójkąta  $ABC$ .
- 7) Trójkąty  $ABC$  i  $S_1S_2S_3$  mają równe pola.
- 8) (Autorskie) Niech punkty  $M, N$  i  $K$  będą środkami boków  $BC, CA$  i  $AB$  w tej kolejności. Okrąg  $\omega$  jest styczny do boków  $BC, CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $D, E$  i  $F$ . Rozważamy punkt  $X$  przecięcia prostej  $NK$  z prostą prostopadłą do prostej  $IM$  przechodzącą przez środek odcinka  $ID$ . Analogicznie definiujemy punkty  $Y$  i  $Z$ . Wówczas punkty  $X, Y$  i  $Z$  leżą na biegunowej punktu Nagela trójkąta  $ABC$  względem okręgu  $\omega$ .

**Rozwiązanie 2.22.** Niech okrąg  $\omega$  będzie styczny do prostych  $l, BC, CA$  i  $AB$  w punktach odpowiednio  $L, D, E$  i  $F$ . Punkty styczności prostych  $A_1A_2, B_1B_2$  i  $C_1C_2$  z okręgiem  $\omega$  oznaczmy odpowiednio przez  $D', E'$  i  $F'$ . Ponadto przyjmijmy, że  $X = EF \cap LD', Y = DF \cap LE'$  oraz  $Z = DE \cap LF'$ . Biegun  $S$  prostej  $l'$  względem  $\omega$  na mocy wniosku 1.13 jest punktem przecięcia prostych  $DD', EE'$  i  $FF'$ . Ponownie korzystając z wniosku 1.13 widzimy, że teza zadania jest równoważna współliniowości punktów  $X, Y$  i  $Z$ . Na mocy twierdzenia Pascala dla sześciokąta  $DEFF'LD'$  mamy współliniowość punktów  $X, Y$  i  $S$ . Analogicznie punkty  $Y, Z$  i  $S$  są współliniowe, a to wraz z powyższym wnioskiem implikuje tezę zadania.

**Rozwiązanie 2.23.** Przyjmijmy, że  $AD \cap BC = P$  oraz  $AB \cap CD = Q$ . Na podstawie wniosku 1.13 wystarczy pokazać, że biegunowe punktów  $H_1, H_2, H_3, H_4$  i  $O$  są współpękowe. Biegunową punktu  $O$  jest oczywiście prosta  $PQ$ . Biegunowymi punktów  $H_3$  i  $H_4$  są na podstawie lematu 2.14 odpowiednie linie środkowe w trójkątach  $CDP$  i  $ADQ$ . Widzimy, że przecinają się one w środku  $S$  prostej  $PQ$ . Podobnie na mocy lematu 3.1, biegunowe punktów  $H_1$  i  $H_3$  to odpowiednie linie środkowe trójkątów  $ABP$  i  $BCQ$ . Również łatwo jak poprzednio zauważamy, iż proste te tną się w punkcie  $S$ . Zatem biegunowe punktów  $H_1, H_2, H_3, H_4$  i  $O$  przecinają się w

jednym punkcie  $S$ , co należało pokazać.

**Rozwiązanie 2.24.** Przyjmijmy następujące oznaczenia,  $\omega$  i  $o$  - odpowiednio okrąg wpisany i opisany na trójkącie  $ABC$ ,  $\omega \cap \omega_a = X_a$ ,  $\omega \cap \omega_b = X_b$ ,  $\omega \cap \omega_c = X_c$ , punkty  $D$ ,  $E$  i  $F$  - punkty styczności okręgu  $\omega$  z bokami odpowiednio  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$ ,  $\omega_b \cap \omega_c = Y_a$ ,  $\omega_c \cap \omega_a = Y_b$ ,  $\omega_a \cap \omega_b = Y_c$  ( $Y_x \neq X$ ). Na podstawie zadania 2.11 wiemy, że proste  $DX_a$ ,  $EX_b$  i  $FX_c$  przecinają się w punkcie  $J$ , będącym biegunem osi potęgowej okręgów  $\omega$  i  $o$  względem okręgu  $\omega$ . Oczywiście  $J$ ,  $O$  i  $I$  leżą na jednej prostej, gdyż oś potęgowa okręgów  $\omega$  i  $o$  jest prostopadła do prostej  $OI$ . Pokażemy, że punkt  $J$  jest środkiem potęgowym okręgów  $\omega_a$ ,  $\omega_b$  i  $\omega_c$ , co jest równoważne tezie zadania. Wystarczy więc dowieść współpękowości prostych  $DX_a$ ,  $FX_c$ ,  $BY_b$ . Z twierdzenia o trzech osiach zastosowanego dla okręgów  $\omega_b$ ,  $\omega_c$  i  $\omega$  wnioskujemy, że proste styczne do okręgu  $\omega$  w punktach  $X_a$  i  $X_c$  oraz prosta  $BY_b$  przecinają się w jednym punkcie, nazwijmy go  $K$ . Wykorzystując wniosek 1.13, widzimy, że pozostało nam pokazać współliniowość biegunów prostych  $DX_a$ ,  $FX_c$  i  $BK$  względem okręgu  $\omega$ . Jednakże, jest to oczywiste na mocy twierdzeń 1.11 i 1.10.

### 3.2 Dwustosunek i cztery lematy

**Rozwiązanie 2.48.** Niech prosta  $MN$  przecina prostą  $AC$  w punkcie  $S$ . Na mocy lematu 2.27 dostajemy równość  $(S, L; A, C) = 1$ . Warunek równości kątów w zadaniu implikuje nam, iż punkty  $S$ ,  $L$ ,  $M$  i  $N$  leżą na jednym okręgu. Jednakże prosta  $BL$  jest dwusieczną kąta  $ABC$ , zatem na podstawie lematu 2.28 mamy  $\angle SBL = 90^\circ$ , stąd  $\angle MNL = \angle SBL = 90^\circ$ .

**Rozwiązanie 2.49.** Przyjmijmy, że  $AC \cap BD = H$ ,  $BC \cap AD = Q$ , oraz niech  $X_\infty$  oznacza punkt w nieskończoności prostej  $AD$ . Na podstawie lematu 2.25 mamy  $B(A, D; M, X_\infty) = 1$ . Skoro pęk prostych  $C(B, P; H, D)$  zawiera proste przechodzące przez punkt  $C$  i prostopadłe do prostych  $BA$ ,  $BD$ ,  $BM$  i  $BX_\infty$ , to jest on również harmoniczny. Zatem  $(Q, A; P, D) = 1$ , stąd łatwo dochodzimy do wniosku, że  $B(Q, A; B, D) = 1$  (czworokąt  $ABCD$  jest deltoidem), w efekcie prosta  $BP$  jest styczną do  $\omega$ .

**Rozwiązanie 2.50.** Niech  $CD \cap AB = R$ . Na mocy lematu 2.25 wystarczy pokazać, że  $D(C, H; K, X_\infty) = 1$ , jednakże  $AD \parallel CH$  stąd należy udowodnić równość  $(R, H; A, B) = 1$ . Związek ten jednak jest oczywisty, gdyż prosta  $CH$  jest biegunową punktu  $R$  względem okręgu  $\omega$ .

**Rozwiązanie 2.51.** Niech okrąg  $\omega$  o środku w punkcie  $I$  będzie styczny do boku  $BC$  w punkcie  $D$ . Na podstawie lematu 2.35 punkty  $X$  i  $Y$  leżą na prostej  $EF$ . Poprowadźmy prostą równoległą do prostej  $BC$  przechodzącą przez punkt  $A$ . Na mocy lematu 2.25 mamy  $(B, C; M, X_\infty) = 1$ , stąd  $(F, E; N, T) = 1$  gdzie  $T = EF \cap AX_\infty$ . Zatem prosta  $AT$  jest biegunową punktu  $N$  względem  $\omega$ , więc  $NI \perp AT$ , a to oznacza, że punkt  $I$  należy do prostej  $ND$ . Punkt  $N$  jest ortocentrum trójkąta  $BSC$ , gdzie  $S = BY \cap CX$ . Po łatwych przeliczeniach na kątach dochodzimy do wniosku, iż trójkąty  $DXY$  i  $ABC$  są podobne. Ponadto wiemy, że  $\angle NDY = \angle XDN$  (zadanie 2.14), stąd  $\frac{NX}{NY} = \frac{DX}{DY} = \frac{AC}{AB}$ .

**Rozwiązanie 2.52.** Przyjmijmy oznaczenia  $BD \cap AC = S$ ,  $AC \cap GE = W$  i  $GE \cap BD = T$  (jeśli  $GE \parallel BD$  teza zadania staje się oczywista). Na mocy lematu 2.27 mamy  $(B, D; S, T) = 1$ , zatem również  $(G, E; W, T) = 1$ . Na podstawie lematu 2.28 widzimy, że  $\angle SAT = 90^\circ$ , stąd ponownie korzystając z lematu 2.28 uzyskujemy tezę zadania.

**Rozwiązanie 2.53.** Równość dana w treści zadania pokazuje, że dwusieczne kątów  $BAD$  i  $BCD$  przecinają się w punkcie  $T$  leżącym wewnątrz odcinka  $BD$ . Na zewnątrz odcinka  $BD$  obierzmy taki punkt  $S$  aby  $\angle ASC = 90^\circ$ , wówczas na podstawie lematu 2.28 widzimy, że  $\angle TAS = 90^\circ$ . Zatem punkty  $P$ ,  $T$ ,  $A$ ,  $C$  i  $S$  leżą na jednym okręgu. Stąd  $\angle BCP = \angle BCT + \angle TCP = \angle TCD + \angle TSP = \angle TCD + \angle AST = \angle TCD + \angle ACT = \angle ACD$ .

**Rozwiązanie 2.54.** Przyjmijmy oznaczenia  $PQ \cap BC = X$ ,  $PR \cap BC = Y$ ,  $AP \cap BR = Z$ ,  $CQ \cap AP = T$ ,  $BR \cap QC = U$  oraz  $BC \cap \omega = M$ . Z twierdzenia Brianchona łatwo otrzymujemy, że biegunową punktu  $U$  względem  $\omega$  jest prosta  $AP$ . Zatem  $(B, R; U, Z) = (T, U; Q, C) = 1$ . Skoro  $P(B, R; U, Z) = 1$ , więc  $(B, Y; M, X_\infty) = 1$  gdzie  $X_\infty = QR \cap BC$  a to na mocy lematu 2.25 daje równość  $BM = MY$ , analogicznie uzyskujemy, że  $MC = MX$ . Oznacza to, że trójkąty  $PCX$  i  $BPY$  są równoramienne, a przez to łatwo uzyskujemy tezę zadania.

**Rozwiązanie 2.55.** Niech symetralna odcinka  $AB$  przecina prostą  $AC$  w punkcie  $E$ . Wówczas  $\angle EBC = \angle EBA - \angle CBA = \angle EAB - \angle CBA = \angle CBA$ . Zatem na mocy lematu 2.28 uzyskujemy równość  $(A, E; C, D) = 1$ . Jednakże  $\angle EMA = 90^\circ$ , więc teza zadania wynika ponownie z lematu 2.28.

**Rozwiązanie 2.56.** Oczywiście proste  $CF$  i  $BE$  są prostymi biegunowymi punktów odpowiednio  $P$  i  $Q$

względem okręgu  $\omega$ , więc proste prostopadłe poprowadzone z punktów  $P$  i  $Q$  do prostych  $CF$  i  $BE$  odpowiednio, przecinają się w punkcie  $I$  - środku okręgu  $\omega$ . Łatwo zauważamy, że zachodzą równości  $(A, B; F, P) = 1$  oraz  $(A, C; E, Q) = 1$ . Na mocy lematu 2.26 mamy zależności  $NF^2 = NA \cdot NB$  oraz  $ME^2 = MA \cdot MC$ . Oznacza to, że punkty  $M$  i  $N$  mają jednakową potęgę względem okręgów  $\omega$  i  $o$  - opisanego na trójkącie  $ABC$ . Zatem prosta  $MN$  jest osią potęgową okręgów  $\omega$  i  $o$ , czyli  $MN \perp OI$  ( $O$  - środek okręgu  $o$ ) - z czego oczywiście wynika teza zadania.

**Rozwiązanie 2.57.** Wystarczy pokazać, że warunek **1)** jest implikowany przez pozostałe warunki.

**2) i 3)** Skorzystaj z podobieństw:  $\triangle ADE \sim \triangle ABE$ ,  $\triangle EDC \sim \triangle EBC$ ,  $\triangle ABF \sim \triangle BCF$  i  $\triangle FAD \sim \triangle FDC$ .

**4)** Teza wynika wprost z definicji symediany w trójkącie.

**5) i 6)** Twierdzenie 1.9.

**7) i 8)** Wykorzystaj twierdzenie Ptolemeusza oraz podobieństwa  $\triangle ABD \sim \triangle MCD$  i  $\triangle ADC \sim \triangle ABN$ .

## Literatura

- [1] Ross Honsberger, *Episodes in Nineteenth and Twentieth Century Euclidean Geometry*
- [2] Roger A. Johnson, *Modern Geometry*
- [3] Clark Kimberling, *Encyclopedia of Triangle Centers*
- [4] Cosmin Pohoata, *Harmonic Division and its Applications*
- [5] [http://om.edu.pl/zadania/om/om50\\_calosc\\_r.pdf](http://om.edu.pl/zadania/om/om50_calosc_r.pdf)
- [6] <http://matematyka.pl>
- [7] <http://mathlinks.ro>