

Egzamin z analizy matematycznej II.1

25 lutego 2023, 10:00 - 13:00

Rozwiązanie każdego zadania należy umieścić na osobnej kartce, wyraźnie podpisanej (drukowanymi literami) imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

Należy szczegółowo uzasadniać rozwiązania powołując się na odpowiednie twierdzenia udowodnione na wykładzie lub ćwiczeniach.

1. (15p) Znaleźć kresy funkcji

$$f(x, y) = \exp\left(-\sqrt[3]{2y+2}\right) \frac{x^2(y+1)}{y+x^3+1}$$

na zbiorze $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$.

2. (15p+5p) Niech $g(x, y) = \cos(\sqrt{x^2 + y^2})$.

a) (15p) Wykazać, że g jest dwukrotnie różniczkowalna na \mathbb{R}^2 .

b)* (+5p) Rozstrzygnąć, czy g jest klasy C^∞ na \mathbb{R}^2 .

3. (15p) Niech $A \subseteq \mathbb{R}^4$ będzie zbiorem $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ spełniających

$$\begin{aligned} \exp(x^2y + z^3) &= 3w - x, \\ \sin(\pi(\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{2}w)) &= y + z. \end{aligned}$$

Udowodnić, że istnieją zbiory otwarte $U, V \subseteq \mathbb{R}^2$ oraz funkcja $h = (h_1, h_2) : U \rightarrow V$ klasy C^1 takie, że $(1, 1) \in U$, $h(1, 1) = (-1, \frac{2}{3})$ oraz

$$A \cap (U \times V) = \{(x, y, h_1(x, y), h_2(x, y)) : (x, y) \in U\}.$$

Wyznaczyć $Dh(1, 1)$ oraz $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(1, 1)$.

4. (15p)

a) Niech $f_1, f_2, \dots : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$ będą funkcjami mierzalnymi i niech $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ dla każdego $x \in [0, 1]$. Czy wynika stąd, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} (1 + f_n(x))^{\frac{1}{f_n(x)}} dx = \int_{[0,1]} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} dx ?$$

b) Niech $f_1, f_2, \dots : (0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$ będą funkcjami mierzalnymi i niech $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ dla każdego $x \in (0, +\infty)$. Czy wynika stąd, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,+\infty)} (1 - f_n(x))^{\frac{x}{f_n(x)}} dx = \int_{(0,+\infty)} (1 - f(x))^{\frac{x}{f(x)}} dx ?$$

5. (15p) Wykazać, że funkcja $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ określona wzorem

$$\phi((x_1, x_2, x_3)) = \sqrt{(2x_1 - x_2)^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

jest normą w \mathbb{R}^3 . Obliczyć trójwymiarową miarę Lebesgue'a (λ_3) kuli jednostkowej w tej normie.